

کورنی باغبیچه





کورنی باغ څه شی دی؟

کورنی باغ یوه کوچنۍ مکه ده چې کورته

نډد وی چیر چې کورنۍ کولی شي تازه

سبزیجات لکه پیاز، پالک، رومی بانجان، کدو او

نور د ورځنۍ مصرف لپاره وکړي. دا باغ

کورنۍ ته روغتیایی او ارزانه خواښه

برابروي.

د کورنی باغ جوړولو لپاره، داسې ځای انتخاب کړئ چې لاند شرایط پوره کوي:

آوبه:

- داسې ځای انتخاب کړئ چې آوبه لږ ول ورتنه په اسانه ترسره شي



خاوره:

- د باغ خاوره باید له کثافتاتو او ککړو اوبو پاکه وي.
- تیاره رنځ او نرمه خاوره، د کرنۍ لپاره بهتره ده.
- ځمکینه خاوره آوبه ساتي خو سخته وي.



لمر و اذنه:

- باغ باید داسې ځای کې وي چې لمر ورته ورسېږي.
- نباتات لږ تر لږه ۶ ساعته مستقیم لمر ته اړتیا لري.
- لمر بولۍ ته ښه وده ورکوي، او آفتونه او ناروغۍ کموي.
- که باغ جنوب ته وي، په هر موسم کې لمر ورته راځي.



مایکرو اقلیم:

- باغچه باید په داسې ځای کې وی چې د تند باد څخه خوندي وي، مثلاً د کور یا ونې تر ښځې.

ساتنه:

- باغ باید د حیواناتو او ماشومانو څخه خوندي وي.
- باغ د انځې په منځ کې جوړ کړه.
- د باغ شاوخوا کڅار، یا اغزن بوټي وکړئ ترڅو ساتنه یې وشي.

آبیاری/اوبه ورکونه:

- لمدۀ او نرمه خاوره چې کنډل یې اسانه کیږي.

د ځمکې برابرول (آماده کول):




- ټوله ځمکه تر ۲۵ سانتي مترو پورې پاکه کړه.
- د بیلچې کولو وروسته، ځمکه د یوې اونۍ لپاره لمر ته پرېږدئ ترڅو حشرات او ناروغی ووژني.
- واښه، ډبرې، ریښې، او کثافات لرې کړئ.
- د حیواناتو سره یا کمپوسټ اضافه کړئ او له ښو خاورو سره یې ګډ کړئ

- ځمکه هواره کړه چې اوبه هر ځای ته ورسېږي.

ځمکه د دوو برخو لپاره چمتو کړئ:

- سبزیجات چې مستقیم کرل کېږي
- سبزیجات چې په لوړه ځمکه کرل شوي وي

اوس ځمکه د کرلو لپاره تیاره ده!



سره

سره ورکول د د معنای لری چ د خاوری لپاره ضروری عناصر چمتو کولی شی. د مناسب انداز سر استعمال د خاوری د کیفیت ساتلو ک مرسته کوی. د سر استعمال باید د خاوری د ازمویند پایلو او د نباتاتو د ودی پر اساس

طبیعی سره ورکونه:

کمپوست:

کمپوست یوه طبیعی سره ده چ د نبات، حیواناتو او کورنیو فاضله موادو له تجزیه څخه جوړی. دا د بکتریاو په مرسته او په تودوخه (له ۴۰ تر ۷۰ درج) ترسره کوی. کمپوس خاوره حاصلخیزه کوی او بو ته وده ورکوی. طبیعی سره د کیمیاوی سر په پرتله غوره او ب ضرره دی.

هغه مواد چ کمپوست تشکیلوی

«قهوه‌ای» تقریباً ۳/۴ کمپوست

- خزانی پاڼی
- شنه واکه
- واکه پاڼی یا د ار بور
- واکه
- کاغذ


«شین» تقریباً ۱/۴ کمپوست

- تازه راڼول شوی شنه واکه (ترجیحاً پرته له پاڅه شوی تخم)
- واکه او د بو و پات شونی
- د پخلنځی څخه د سبزیجاتو کثافات
- د حیواناتو فاضله مواد
- د حیواناتو داخلی برخه – د وژن وروسته زخمونه
- ادرار (دا یوه قوی ماده ده، نو یواز ل مقدار ته اکتیا ده)

که ل مقدار شنه مواد ور اضافه شی، کمپوس به بد بوی ولری.

که ل نسواری مواد اضافه شی، د کمپوست کولو

د و س ه د و ش ټوډه کمپوست



د کمپوست د کندنو ستونزې او حل لارې يې

حل لارې	ستونزه	ننګ
مواد پکې تاو را تاو کړئ مخکيني جمع شوي مواد له نويو هغو سره يو ځای کړئ او يوه نوي کنده وکندئ د نايټروجن منبع لکه تازه سر، د وينې سر يا پرې شوي چمن سره ځمکه کړئ	کافي هوا نشته کنده ځمکه کوچنۍ ده. د نايټروجن کمښت	کمپوست بد بوی کوي کمپوست لوند دی او په منځ کې ځمکه ځرم دی، خو په نورو ځايونو کې نه دی توده نمجنه او خوشبويي ورکوي، خو ځمکه نه دی.



کمپوست هغه وخت د استعمال لپاره چمتو دی چې نسواري رنځ راوړي او په بشپړ ډول تجزیه شوی وي.
د استعمال طريقه: يو موخې کمپوست د سبزی له ځمکې سره په يوه ژور ځای کې اضافه کړئ، يا د تخم اچولو مخکې
 (لکه کچالو يا غنم) د ځمکې ته واچوئ، او يا د میو ونو د رينځو شاوخوا خاوره کې ښکته کړئ.

حيواني فضله مواد:



حيواني فضله مواد چې له غوځلو تر لاسه کړای،
 د نباتاتو د ودې لپاره کافي مغذي مواد لري. له
 حیواناتو تر لاسه شوې سره باید له ۳ تر ۶
 میاشتو پورې وساتل شي او وروسته خاورې ته
 ورزیاته شي. په هر جریب ځمکه کې د دې موادو
 له ۱ تر ۲ مټرک ښه مناسب دی.

شنه سره:



نباتات لکه واکه یا لوبیا د حاصلخیز او د خاور رطوبت ساتلو لپاره کرل کېږي. د تخمونو له تولید مخکې، ټول دا بوټي له خاور سره ښکته کېږي ترڅو د خپلو ریښو او پاڼو څخه مغذي مواد خاورو ته ورزیات کړي.

پروسس شوی ادرار :

تازه انساني او حیواني ادرار د نبات د ودې لپاره د نایتروجن او نورو مغذي موادو بڼه سرچینه ده. ادرار کولای شي تازه یا د ټو اونیو یا میاشتو لپاره په مهر شوی کوتي کې د ذخیره کولو وروسته وکارول شي. ادرار د اوبو سره په ۱۰:۱ نسبت کې رقیق کړئ او مستقیم یې خاور ته، د بوټو له پاڼو څخه لرې واچوئ.

د چرټانو فضله مواد:



د چرټانو سره کې نایتروجن، فاسفورس، او پوتاشیم شامل دي او د اغیزمنې سرې په توګه پیژندل شوي، خو باید رقیق شي ترڅو د بوټي د سوځېدو مخه ونیسي. د مایع سر د جوړیدو مرحلې:

- یوه برخه د چرټو فضله موادو له اوبو سره په یوه کاسه کې ښکته کړئ.
- مخلوط ته ټټه کړئ، لوی پوټ کړئ، او د ۲ څخه تر ۳ اونیو پورې یې پریږدئ چې تخمیر شي او مغذي مواد اوبو ته انتقال کړي.
- مخلوط د زوږ ټټه کړئ، سره صاف کړئ ترڅو جامد توکي جلا شي او نرم مایع سره ترلاسه کړي.
- مایع سره د ۱ برخې سرې او ۴ برخو اوبو نسبت سره ښکته کړئ او بیا یې عیار کړئ.

د بوټو د اټیاوو سره سم یې رقیق کړه.

غیر عضوی سر:



- **معدنی طبیعی سر:** لکه د پوتاشیم نایټرید او د چونډ ټبره، چې نباتاتو ته این معدنی مواد برابر وی.

- **مصنوعي سر:** په افغانستان کې تولید شوی کیمیاوی سر اکثره په ۵۰ کیلو ګرامه ګڼو ګڼ شتون لري. دغه جامد کیمیاوی سر د نبات د ژر او مستقیم مصرف لپاره متمرکز مغذي مواد وړاندې کوي.

په هر هکتار کې د کیمیاوی سر د کارولو اندازه، وخت او مرحله:

یوریا (سپینه سره):



- د کارونډ اندازه: په هر جریب کې له ۲۰ څخه تر ۴۰ کیلو ګرامه پورې، نیمایی یې د کرلو پر مهال او پاتې نیمایی یې د ودې په وخت کې وکاروئ.

د کارونډ وخت او مرحله:

- د بولۍ له کرلو دمخه، د ګڼمکې د چمتو کولو او کرلو په وخت کې
- د ودې په لومړیو مرحلو یا د ګڼ کیدو په مرحله کې

توره سره:



- د استفادې اندازه: د هر جریب لپاره له ۴۰ تر ۱۲۰ کیلو ګرامه د استفادې وخت او مرحله:

- د چمتووالی او څښولولو په وخت کې، د ګڼمکې کولو مخکې
- د ودې موسم په پیل کې، کله چې بولۍ د بشپړ ودې په حال کې وی.

پاشیمی سر:



- د استفادې اندازه: په هر جریب کې له ۳۰ تر ۴۰ کیلو ګرامه د استفادې وخت او مراحل:

- د کرلو څخه مخکې د اصلی سر په توله
- د ودې په پیل کې

بادرنګ:

بادرنګ يوه کلنه سبزی ده؛ ژيې ځلان لری او بوټی يې تر ۴ مترو پورې وده کوی. د افغانستان بادرنگ اوډوالی له ۱۵ څخه تر ۲۵ سانتي مترو پورې دی. د بادرنگ اصل هندوستان دی. د بادرنگ ترکیب ۹۵ اوبه دی؛ خو شکر، نشايسته، پروټين، د ويټامينونو زيات مقدار او پوټاشيم



د بادرنگ کرلو طریقه:

طریقه	د کرنې اړخونه	سمبول
• د پسرلي او دوبي پیل (له حمل تر سرطان)	د تخم کرلو وخت	
• تخم ژوروالی: له ۱.۵ تر ۲.۵ سانتي متر	د تخمونو د کلت ژوروالی	
• له ۳۰ تر ۶۰ سانتي متر	د بوټو تر مېنځ واټن	
• له ۱۰۰ تر ۱۵۰ سانتي متر	د کنارونو تر مېنځ واټن	
• له ۱.۵ تر ۳ کيلوگرام في هڪټار	د تخم د ضرورت وړ اندازه	

• د نباتاتو د ودې لپاره مناسبه تودوخه • د تودو موسم: له ۲۵ څخه تر ۳۰ درجې سانتی ګراد	د ودې لپاره مناسب اقلیمي شرایط	
• له ۱۵ تر ۲۰ ګن فی هکتار	طبیعی سره	
• له ۴۰ تر ۵۰ کیلوګرام فی جریب	توره سره	
• له ۵۰ تر ۶۰ کیلوګرام فی جریب په ۲ یا ۳ ګوز په جلا ګول	یوریا (سپینه سره)	
• په هر جریب کې د ۳ له ۴ تر ۴ کسان (۳۰۰۰ تر ۴۰۰۰ کیلو ګرامه) په بشپړه توګه خرابه شوی حیواني سره تطبیق کول. • له ۸ څخه تر ۱۲ پورې کسان د پاکه شوی حیواني سره په هر جریب کې له ککړت مخکې وکارول.	حیواني سره	
• له هرو ۵ تر ۷ ورځو پورې، د هوا د حالاتو سره سم اوبه ورکول. • په ګمکه کې د اوبو د جمع کولو مخه ونیستل.	آبیاری (ابخور)	
• له ۱۵ تر ۲۵ ګنه په هکتار کې (د نوع او د ساتنې طریقې له مخې، توپیر لري)	د محصولاتو را ګلول	

د بادرنګ د ناروغیو درملنه :


ناروغی	درملنه	انځور
سپینګی	• له مقاومو ارقامو استفاده • د فصلونو بدیله کرڼه • د اوبو جذب او ساتلو وړتیا • د ککړو پاتې شونو له منځه وړل • د اتیل فوایفیت المینیوم سره درملنه هر ۱۵-۱۰ ورځې	
آنتراکنوز	• د مقاوم ټولونو کارول • د سالمو تخمونو کارول • ککړ پاتې شونی له منځه وړل • د واکو له منځه وړل • د مانکوزب سره سپر کول د دوه په زر ګرامه په نسبت سره (۲ ګرامه په لیتر)	
د بولې میری ناروغی	• کرڼه ګډ تناوب دوران مراعتول • د مناسبې مکې اګل • د بادرنګ بولې سره د اوبو د اټیکې مخنیوی • د خرابو شوو بولې پاتې شونی له منځه وړل • د زینب او متالاکسین د یوه ګرام په اندازه په یوه متر مربع کې سپر کول • د پروپاموکارپ درمل کارول: کله چې ۵-۴ پاڼې وې - په یوه متر مربع کې ۲۵ ګرامه - د بولې شاوخوا وکارول	
موزائیک ناروغی	• سموم تیرام - زیرام • له ۷-۱۰ ورځو په وقفو سره تر هغې پورې وکارول شی چې د ککړتیا شرایط موجود وي. • تخم کولای شی د بنومیل - تیوفانات - میتیل - یا پورته یاد شویو مصالحو یوه سره ضد عفونی شی.	



رومی بنجان / سره بنجان:

رومی بنجان د ډېرم موسم سبزی ده. خلک رومی بنجان عموماً تازه، پاخه شوی، روب، چکنی او ساس په ډول کاروی. دا نبات د تخم یا نهال څخه کرلی کېدی شي. رومی بنجان د صحت لپاره ډېر ښه لري چې په کې اوسپنه، منرالونه او د A، B او C ویتامینونه شامل دي. په ۲۳ ګرامه رومی بنجانو کې ۹۴ سلنه اوبه دي، لږ مقدار کلسیم، انرژي، پروټین او د C ویتامینونه هم لري. رومی بنجان مختلف ډولونه لري او د رنګ، انداز او خوند له مخې



طریقه	د کرنې اړخونه	سمبول
• له ۱۵ د دلو تر ۱۵ د حوت	د تخم د کرلو وخت	
• له ۳۰ تر ۴۵ سانتي متر	د بوټو تر مېنځ واټن	
• له ۱۰۰ تر ۱۲۰ سانتي متر	د لیکو تر مېنځ واټن	
• عموماً د انتقال څخه له ۶۰ تر ۸۵ ورځو وروسته وي، خو دا د هغې په ډول پورې اړه لري.	د ودې د پرمختګ وخت	
• ۵۰ ګرام په فی جریب کې	د تخم د اټیاو اندازه	

له ۵.۵ تر ۷.۵ پورې باید وی	د خاور د پی اچ سطحه	
- په هر هکتار کې له ۲۰ تر ۲۵ ګڼه کمپوس یا حیواني سره وکاروئ. - د کوچنیو ګڼمکو لپاره، په هر جریب کې له ۴ تر ۵ ګڼه حیواني سره وکاروئ.	طبیعی سره	
له ۳۰ تر ۴۵ کیلوګرام توره سره	توره سره	
په دوو وختونو کې له ۴۰ تر ۴۵ کیلوګرامه توره سره (د کرلو مخکې او د لمونو تولید مخکې)	یوریا (سپینه)	
- د حرارت درجه له ۲۱ څخه تر ۲۷ سانتي ګراډه پورې ده. - رومي بانجان د یخ او ګرم حرارت (له ۳۵ سانتي ګراډه پورته) په وړاندې حساس دی.	اټین اقلیم	
- ریښايي سیستم نسبتاً ژور دی. - ریښايي معمولا له ۶۰ تر ۹۰ سانتي متر پورې وده کوي، خو ږیری ریښايي د خاورو په سر ۳۰ سانتي مترو کې تمرکز لري.	ریښايي سیستم	
- لومړۍ بولۍ چمتو کېږي او بیا په دوچو کې کرل کېږي. - خاوره باید شلنه، نرمه او له ناروغیو خلاصه وي.	د کرلو طریقه	
- د کرلو په اولو وختونو کې هر ۱۰ ورځې وروسته باید اوبه ورکړل شي. - په اولۍ کې هره اونۍ یو ځل اوبه ورکړل شي.	آبیاري/اوبه ورکونه	

• که چیر میوه لر ایونو ته انتقالیی، باید د هغه را ولول په هغه مرحله کې ترسره شی چې رنځ یې زیږ د ناشپته په شان وی. • د پروسس او تازه مصرف لپاره، میوه باید په بشپړ رسېدلی حالت کې را ولوله شی. • را ولول باید د سهار په ساعتونو کې ترسره شی او میو په سیوری کې وساتل شی. • میو د را ولولو څخه تر ۱۰ ورځو پور په یخچالونو کې ساتل کیدی شی.	حاصل را ولول او ذخیره کول	
• په فضا کې کرڼه • په هر هکتار کې له ۲۵ تر ۳۵ ښه (په هر مربع متر کې له ۲،۵ تر ۳،۵ کیلو ډرامه) • د اوږده حاصل لرونکی هایبر ډولونه (د ښه زراعتی طریقو په رعایت سره): • په هر هکتار کې له ۵۰ تر ۶۰ ښه (په هر متر مربع کې له ۵ تر ۶ کیلو ډرامه) • په ښخانه کې کرڼه • په هر هکتار کې له ۱۰۰ تر ۱۵۰ ښه (په هر متر مربع کې له ۱۰ تر ۱۵ کیلو ډرامه)	د حاصلاتو اندازه	



د رومی بنجانو عام ناروغۍ:

ناروغی	د ناروغۍ لامل	انځور
د میو سر خرابیدل / خوسا کیدل	- د ناروغۍ نښې ځکه رڼې وخت مېوه کې لیدل کېږي، که څه هم ښه، پامه او ریښه یې هم ککړېدلې شي. - دغه ناروغی په مېوه کې ښه او ژور داغونه جوړوي.	
بوټی خوځونکي چينجی	د ډیپلریکس پوړ د بوټی د خرابوالي په لومړیو وختونو کې په هر لیتر اوبو کې له ۱،۵ ګرام سره حل کېږي او د محلول ورکول داسې وکړي چې د بوټو بلخ ښه وپوړي.	
شپشک	- د مکران ۲ ملی لیتر په یو لیتر اوبو کې وکاروي یا میتا سیستوکس وکاروي د دې لپاره چې د ونو میډیو/چینجیو سره مبارزه وشي. - له بوټی خرابه پامه پرې کېږي. پر خوځو موادو کې لمدې ژبې کاغذونه په یوه مناسب ځای کې نصب کېږي، د شپشک ضد درمل لکه آزینافوس، اندوسولفان او د پاراتیون په کارولو سره خپل بوټي وژغوري.	 
شانکر بکټریا	د شانکر بکټریا کولی شي د رومی بوټی د وده کولو په ټولو پلاوونو اغېز ولري. کله چې ټوان بوټی ککړ شي، ممکن ژر له مړینه ولا شي. د شانکر بکټریا لومړنۍ نښې په بوټو کې ودریدو او د رڼو، پامه دې او ښه په اوږدو کې د روڼانه کرښو جوړیدل دي.	
سوی یا ښه وښه	عموماً دا د مېو لاندې برخه (ملکاه) کې ښکاري. رومی مېو په دې حالت کې اکثره خپله عادي ښه له لاسه ورکوي او شکل یې خرابېږي، داسې چې د ملکاه په نښه کې لویې سوري یا نسواري پونه د لرې په شکل کې ښکاري.	



تور بنجان :




تور بنجان د لرم موسم سبزی ده. دا نبات نرم دی او په لرمه هوا کې له وده کوی. په لرمو سیمو کې د یو کلنۍ کټ لپاره کرل کیږي. ساقه یې ازغنه او لالان یې سپین یا ارغواني دی چې په منځ کې ژبې رنګه وی. د تورو بنجانو لووالی معمولاً له ۵۰ تر ۱۵۰ سانتي متره پورې وی. پالې یې لویې او نرمې دي. لینې وحشی ولونه یې تر ۲۲۵ سانتي متره پورې وده کوی. د تورو بنجانو مټو د هڅې په لیر، لاندونکې او تیاره ارغواني رنګ


د تورو بنجانو عام ناروغۍ:

طریقه	د کرکيلۍ اړخونه	سمبول 
- په لرمو سیمو کې: د پسرلي په پیل کې تر اوسط دوبي پورې - په لرمو سیمو کې: د لمرکې د یخیدو خطر له منځه تللو وروسته	د تخم کرلو وخت	
له ۵۰ تر ۶۰ سانتي متر	د قطارونو تر منځ واکن	
له ۴۵ تر ۵۰ سانتي متر	د بوټو تر منځ واکن	
له ۷۰ تر ۹۰ ورځو وروسته له انتقال	د لویېدو دوران یې	
- په هر جریب لمرکې کې، ۴۰۰ لمرامه تخم ته اړتیا ده. - که پلاستيکی پوټ وکارول شی، ونه له ۳۵ تر ۴۵ ورځو کې چمتو کېږي. - له یوه جریب لمرکې شاوخوا ۲۱۰۰ نوډونه ترلاسه کېږي.	د تخم اړین مقدار	

له ۶.۰ تر ۷.۰ (په نسبتا تیزابی او نورماله خاروه کلا)	د خاور پی اچ	
- له کرنا مخک په هر هکتار کلا له ۲۰ تر ۳۰ ګانو پور چرګانو سره یا کمپوس وکارول شی. - د یوه جریب ګمک لپاره، ۴ ګنه د چرګانو سره کفایت کوی.	طبیعی سر	
۵۰ کیلوګرامه فی هکتار د کلا په وخت کلا	توره سره	
۵۰ کیلوګرامه سپینه سره په فی جریب ګمکه کلا.	یوریا (سپینه سره)	
د ود لپاره مناسب حرارت له ۲۷ څخه تر ۳۳ درجې سلسیوس (سانتی ګرېډ) دی.	مناسب اقلیم	
قوی رېله یی سیستم (ژور اصلی رېله) لری او یر ګانې لری؛ نرم او ګاڼ خاور ته اګیا لری.	د رېلو سیستم	
- لومبای تخمونه په ساده خاوره کلا وکړی. - له ۴ تر ۶ اونيو وروسته، روغ بوټی ګاڼ چمتو شوی خاور ته چلا د عضوی موادو څخه غنی وی ولګدوی. - خاوره باید لومای وی، اوبه جذب کلا، مناسبه او حاصلخیزه وی.	د کلا ګول	
- بوټو ته باید منظم اوبه ورکلا شی. - په وچه هوا کلا، له هرو ۵ تر ۷ ورځو پور یو ګاڼ اوبه ورکلا. - د خاور په سطحه د اوبو جمع کلا څخه ګان وساتئ ګکه چلا د رېلو ناروغ پیدا کوی.	آبیاری / اوبه ورکونه	

• مټو هغه مهال راټوله کي چې مټو ډلا لرونکي، نرمه او کلکه وي. • د مټو توليد د زياتولو لپاره، هرو ۳ يا ۴ ورځو کې يو ځل د ميو راټولول وکړي. • د نبات د زيان مخنيوي لپاره له چاقو يا بيات څخه استفاده وکړي. • تازه راټول شوي بانجان په له ۱۰ تر ۱۲ حرارت سانتي ډرادي او ۹۰ رطوبت کې وساتي. • دا کولي شي له ۷ تر ۱۰ ورځو پورې وساتل شي. • د ږير ځي حرارت په ځاي کې د ساتلو څخه ډک وکړي - ممکن يخ شي.	حاصل راټولول او ساتل يې	
• په خلاصه فضا کې کرنه (عادي ټولونه): • له ۲۵ تر ۴۰ ځنه في هکتار (له ۲،۵ تر ۴ کيلو ډرام په هر مربع متر کې) • د لوې حاصل هيبريد ټولونه (د مناسب پاملرنې او مديريت سره): • له ۴۰ تر ۶۰ ځنه في هکتار (له ۴ تر ۶ کيلو ډرام په هر مربع متر) • ځمخانه کې کرنه (محافظتي کرنه): • له ۶۰ تر ۸۰ ځنه في هکتار (له ۶ تر ۸ کيلو ډرامه په هر مربع متر)	د محصولاتو اندازه	 د تورو بنجانو عام ناروغۍ:
انځور	درملنه	ناروغي/وباء
د ناروغيو وېش		
	• د هغو تخمونو يا کوچنيو نباتاتو څخه استفاده وکړي چې د بولبو او افتونو څخه پاک وي او په ضد عفوني شوي خاوره کې کرل شوي وي. • د هر ځول فنډس د له منځه وړلو لپاره، تخمونه د فنډس ضد موادو پواسطه درملنه وکړي. • تخمونه په سطحې توله وکړي يا تر هغې پورې کرنه ونه کړي چې خاوره ډرمه شي.	په پاڼه کې د سرکو سپورا لکه يا داغ
	• ککې نباتات له منځه يوسي ترڅو د ناروغ فکټورونه کم شي. • يواځې د ناروغ څخه پاک تخمونه او روغ ټکي وکاروي. • د ناروغ د کنټرول لپاره، ممکن اړينه وي چې مناسب فنډسايونه وکارول شي.	د مټو تخريب او فوموپيسيس
	• که د ناروغ نڼه وويني، د دوه کلونو لپاره غير حساس نباتات په متناوب ځول وکړي. • د پاسنې زياتو اوبو ورکولو (د باران سيستم) څخه ډک وکړي. • يوازې په هغو خاورو کې کر وکړي چې د اوبو د جذب توان ولري.	فايتوف ناروغي

د حشراتو وېش


	• له د مخکې چمک وکړي، تر لاسه کړي چې هیڅ حشره شتون نلري. • که امکان ولري، مقاومت لرونکي ټولونه وکاروي. • انعکاسي مالچونه لکه د سپین رنځ پلاستیک کولی شي د نبات څخه د حشرو د تغذیې مخنیوی وکړي. • مقاوم نباتات کولی شي د تلزو اوبو په پاشلو سره حشرې له پاڼو جلا کړي.	حشرې (شفتالو) حشره، کچالو (حشره)
	• د د حشرې کنټرول کولی شي ستونزمن وي، ځکه چې دا حشره د حشراتو ضد دواوو په وړاندې لوڼه مقاومت لري. • په کورنیو بڼو کې: • د کچالو وختي او مختلف ټولونه کرل باعث کېږي چې نباتات د ښو زیانونو څخه خوندي پاتې شي. • بالغ حشرات او لاروې باید له نباتاتو څخه وایستل شي او د صابون په اوبو سره له منځه یوړل شي.	قانعزک کلراڼو
	• له ده چې د د آفتونو د ښودلو څخه مخکې له محافظتي پوښونو (نرم پلاستیک یا د لامبو جال) څخه استفاده وشي ترڅو د فزیکي خنډ په توګه د ښو بڼو ساتنه وشي. • همدارنګه، تخم باید ژر وکرل شي ترڅو بولې مخکې له د چې آفت پرې حمله وکړي وده کړي وی او ریښې یې ښکته کړي وی، ځکه بالغ بولې د ښو بڼو په پرتله لږ زیانمن کېږي.	کمرنگه حشرات

پالک:



- پالک یوه شنه او ښه سبزی ده. د پالکو پاڼې ویتامین A او C، اوسپنه، کلسیم او فایبر لري. دغه سبزی د صحت لپاره ښه ښه ښه او په خوړلو کې کارول کېږي. د پالک خوړل د سترګو د روغتیا، د زړه ناروغیو مخنیوی، د شکر کنټرول، د بدن

د پالک د کرلو طريقه


طريقه	د کرلو لار چار	سمبول
• له مارچ تر اپريل	د تخم د کرلو وخت	
• له ۲۰ تر ۳۰ سانتي متره	د دوچو تر مټنځ واټن	
• له ۴۰ تر ۵۰ سانتي متره (خوا په خوا کرنه يې هم رواج ده)	د بوټو تر مټنځ واټن	
• د کرلو څخه ۴۰ ورځې وروسته (شونې ده چې شنه پالک له ۲۵ څخه تر ۳۰ ورځو پورې هم راټول شي.)	د پخېدو وخت	
• له ۲۰ تر ۲۵ کيلوگرام في هکتار	د ضرورت وړ تخم مقدار	
• له ۶.۰ تر ۷.۵ (په نسبتاً ټولګړاۍ او عادي خاوره کې)	د خاورې پي اېچ	
• د پالک تخمونه له ۱ تر ۱.۵ سانتي مترو (تقريباً نيم انچه) ژوره ګرځول	د تخم د کټ ژور تيا	
• له کټ دمخه، په هر هکتار کې بايد له ۱۵ تر ۲۰ ګڼه حيواني سره اضافه شي.	طبيعي سره	

• د کرلو پر مهال له ۸۰ تر ۱۰۰ کیلو ګرام توره سره وکاروئ.	توره سره	
• په هر هکتاره کې له ۴۰ تر ۶۰ کیلو ګرامه، معمولاً د پاڼو تولید وروسته او د نبات د چټک ودې په وخت کې وکارول شی.	یوریا (سپینه سره)	
• د نبات غوره وده له ۱۵ تر ۲۰ درجو ګرمۍ کې پیلېږي. • زیاته تودوخه (له ۲۵ درجو څخه ګرم) نبات اډ کوی چې ژر ځلان تولید کړي.	اټین اقلیم	
• چې ریښې یې لږ ژورې وي او په نرمه خاوره کې، چې اوبه ژر جذبوي او د عضوی موادو له مخه غني وي، له وده کوي.	د ریښو سیستم	
• کرۍ ای کرل او د تخم خپرول (شال) • خاوره باید حاصلخیزه، نرمه او د اوبو د جذب او ساتلو وړتیا ولري.	د کرلو طریقه	
• د خاور ګرمۍ او نمجنۍ ساتلو لپاره منظم او سپک اوبه ورکول ضروري دي. • د اوبو اندازه باید مناسبه وي، که نه نو دا به د پاڼو په خوند او کیفیت کې کموالی راولي. • په یخ آب و هوا کې، په ۵ تر ۷ ورځو کې اوبه ورکړئ. • په ګرم آب و هوا کې، هر ۲ تر ۳ ورځو کې اوبه ورکړئ ترڅو د ځلمونو د وخت مخکې د تولید مخه ونیول شي.	آبیاری / اوبه ورکول	 
• حاصلات باید هغه وخت راټول شي چې پاڼې نرمې وي او مطلوب اندازه ته ورسېږي (عموماً په هر بوټي کې له ۸ څخه تر ۱۰ پاڼو پورې) وي. • بهرنۍ پاڼې یا ټول بوټي پرې کړئ. • له صفر ۰ څخه تر ۲ درجو سانتي ګرمۍ کې په اوږده رطوبت کې د ۱ څخه تر ۲ اونيو پورې باید وساتل شي.	حاصل راټولول او ذخیره کول	
• په عادي شرایطو کې د هر هکټار لپاره له ۸ څخه تر ۱۲ ګنه • په ګډه مدیریت یا خوندي کول کې د هر هکټار لپاره له ۱۵ څخه تر ۱۸ ګنه.	مښکني حاصل	

د پالکو ناروغۍ او د هغوی درملنه

د ناروغۍ نوم	درملنه	انځور
د فنډسونو ککړي پوریاڼه	• یوازې د ناروغۍ څخه پاک د نباتاتو تخم وکاروئ. • که امکان وي، د پاشېدونکي اوبو يا له باران اوبو ورکولو څخه ځکه وکړئ. غوره ده چې د نبات رېښو ته اوبه ورکړلای شې ترڅو پاڼې وچې پاتې شي. • که ناروغي خپره شي، ښه وختونه د مسو لرونکي فنډس وژونکي مواد کارول کېږي، خو دا مواد عموماً د ناروغۍ په کنټرول کې یراغیزمن نه وي.	 
نیمه پخول	• پالک په هغه خاورو کې وکړئ چې اوبه پکې تېرېدای شي. • د اوبو ورکولو مدیریت داسې وکړئ چې خاوره ښه لنډه نه شي. • له هغو تخمونو استفاده وکړئ چې د فنډس ضد موادو سره یې درملنه شوې وي. • په یوه ځای کې د پالک له پرله پسو کرلو څخه ځکه وکړئ.	
د حشراتو له بندې	• که کهنه یا حشر یوازې په ځو پاڼو یا ښوونو برید وکړي، نو کولای شو د ځو برخو پرې کولو سره افت کنټرول کړو. • مخکې له دې چې بوټ انتقال شي، ځو ترلاسه کړئ چې داسې افت شتون نه لري. که امکان ولري د آفتونو پر وړاندې مقاومت لرونکي ځولونه وکړئ. • انعکاسي مالچونه لکه د سپینو زرو رنځ پلاستیک کولی شي آفتونه د بوټو د خوځولو څخه لرې وساتي. • په مقاومت لرونکو بوټو باندې اوبه په لوې فشار وپاشئ ترڅو آفتونه له پاڼو جلا شي.	
د لیبزو چینجیو کنټرول	• د لیبزو چینجیو د طبیعي کنټرول لپاره د طبیعي دوښمنانو له لارې بیولوژیکي کنټرول شامل دی چې لاروا پرازېلې کوی او د <i>Bacillus thuringiensis</i> هم پکې شامل دی. • د سوداګریزې کنټرول لپاره کیمیاوي مواد شتون لري، خو ځیری هغه چې د کورني باغونو لپاره موندل کېږي، د لارواوو د کنټرول په برخه کې یراغیزناک نه دي.	
لوپړ چینجی کنټرول	• د لوپړ چینجیو نفوس معمولاً د طبیعي دوښمنانو لخوا په توازن کې ساتل کېږي. که دغه چینجی ستونزمن شي، کولای شو چې د لاروه په لاس یې د بوټو څخه راټول کړو. • د منل شویو طبیعي میتودونو یوه لار د <i>Bacillus thuringiensis</i> مطابقت دی، چې په مؤثره توګه ځوان لاروه له منځه وړي.	


گازره:




لازر د منځنۍ آسيا اصلي سبزی ده او خورا ښه وړه ده. لازر ښه وړ وېلامین A او C لري چې د بدن د پياوړۍ کولو او د ناروغيو د مخنيوي لپاره مرسته کوي. لازر د زړه لپاره ښه وړ دی او د خوراک هضم کې مرسته کوي، ځکه چې ښه وړ فايبر پکې شته. لازر تر بله هر سبزی زيات وېلامین A لري. لازر ښه وړ مواد هم لري چې کاروتینوایډ او فليونوایډ نوميږي او بدن د ناروغيو څخه ساتي. بېلا کاروېلین د دې موادو څخه یو دی چې د زړه، سترگو او عمومي روغتیا لپاره خورا ښه وړ دی. هر څومره چې د لازر نارنجی رنګ تیاره وي، هومره ښه وړه زیاته ده.


د لازر د کرلو طریقه:

طریقه	د کرلو اړخونه	سمبول
• له سپتمبر تر نوامبر	د تخم د کرلو وخت	
• ۲۰ سانتي متر	د دوچو تر منځ واټن	
• ۵ سانتي متر	د بوټو تر منځ واټن	
• د تخم د درې چنده اندازه	د کټ ژوروالی	
• له ۷۵ تر ۱۰۰ ورځو (د دې ځول او هوا له مخه)	د پخیدو وخت	

• د اټيا وټاندازه تخم له ۴ تر ۶ كيلوگرام په في جريب ټمكه ك		
• له ۶.۰ تر ۷ (په نسبتا تيزابي او عادي خاوره ك)	د خاور ټي اچ	
• له ۲۰ تر ۲۵ ټنه په هر هكتار ك د ټمكه د چمتو كولو پر مهال د حيواني سر ټ سره ټه شي.	طبيعي سره	
• په هر هكتار ك بايد د كرلو پر وخت له ۱۰۰ تر ۱۲۰ كيلو ټرامه تطبيق شي تر ټو ريټو ټواكمنه وده وكلي.	توره سره	
• له ۶۰ تر ۸۰ كيلو ټرامه په هر هكتار ك بايد دوه ټل تطبيق شي: لوملي ټل د كرنځ ټخه ۳۰ ور ټ وروسته. دوهم ټل، د ريټو د وده كولو په مرحله ك (تقريباً د كرنځ ټخه ۵۰ تر ۶۰ ور ټ وروسته).	يورپا (سپينه سره)	
• مناسبه تودوخه: له ۱۵ نه تر ۲۵ درجو سانتي ټراد • ټل تر ټه تودوخه: كم سا ټه زغملې شي، خو سخت سا ټه كولاي شي ريټو ته زيان ورسوي. • غوره تودوخه: له ۳۰ درجو سانتي ټر ټه پورته تودوخه كولاي شي د ريټو ضعيفيدو او تريخوالي سبب شي.	مناسب اقليم	
• د ريټو ټول: ژور ريټه يي سيستم • اصلي خو ټنيزه ريټه په خاوره ك ژوره وده كوي او كوچنځي جاني ريټو لري چا د خو ټو مواد جذبوي.	ريټه يي سيستم	
• تخمونه بايد په مستقيم ټول پر چمتو شو ټ خاوره باند ټ وشيندلي شي. • خاوره بايد نرمه، ژوره او د اوبو د جذب وټ تيا ولري. • سخته خاوره كولي شي د ريټو د مناسب ټو د مخه ونيسي.	د كټ طريقه	
• له كرلو مخك ټمكه ته بايد اوبه وركټل شي تر ټو خاوره لنده شي. • خاوره د بوټي د را ټوكيدلو لپاره بايد كافي لمده وي. • له كرلو وروسته، هره اوون ټو ټل اوبه بايد وركټل شي.	آبياري/اوبه وركونه	

• له ۱۰ تر ۱۵ ورځو مخکې راټولولو، اوبه ورکول ودرول. • د لارو پاڼې کومې چې د خاورې له سطحې څخه له ۲.۵ تر ۵ سانتي متره لوړې وي پرې کول. • لارې معمولاً د ۹۰ ورځو وروسته د راټولولو لپاره چمتو وي.	حاصل راټولول او ذخیره کول	
• په هر جریب کې له ۸ تر ۱۲ ښه (د خاورې، د تخم ټول او اقلیم په نظر کې نیولو سره). • په مناسبو شرایطو کې، حاصلات کولی شي تر ۱۵ ښو پورې جریب ته ورسېږي.	د حاصلاتو اندازه	

د لارې ناروغۍ او درملنه:

ناروغۍ	درملنه	انځور
پوځي سپینکۍ	• فنجي وژونکي مواد چې سلفر او مانکوزیب ولري په توصیه شوې اندازه وکارول.	
نرمه بکتریايي ککړتیا	• د ریڼو د زیانمنیدو په دوران کې د میوې د راټولولو مخنیوی وکړئ او ککړ ریڼو یې لیرې کړئ.	
ریڼه - غوزه	• کرونده د غیر کوربه بوټو لکه جوارو سره ځمکه کړئ. • مارټولینونه د موسمونو ترمنځ وکړئ او کله چې ځمکه چمتو شي، وې کارول. • مارټولینونه د لیکو او لارو په اوږدو کې هم کرل کیدای شي.	
د الډرنلریا سوډیدنه	• له مقاومو یا زغملو ټولونو لکه Terracotta او S-505 څخه استفاده وکړئ. • که ککړتیا جدي وي، د فلفس وژونکو لکه Mancozeb یا Chlorothalonil څخه استفاده وکړئ، د لاروونو سره سم سپارښتلی شوې اندازه مراعات کړئ.	

تراتیژیک



- تراتیژیک بوټی د ختیځې مدیترانې سیمې محلی بوټی دی. دغه بوټی کلنی شین وی او له ۲۰ څخه تر ۳۰ سانتي مترو پورې وده کوي. تراتیژیک کولی شي خام وڅوړل شي او کله ناکله پخيدی هم. تراتیژیک د C او E ویدامینونه لري چې قوي انرژي اکسیدانت اغیز لري. دغه ویدامینونه د بدن ساتنه کوي د زیان رسوونکو آزادو رادیکالونو په وړاندې او د سرطان حجرو ودې مخه نیسي. تراتیژیک معمولاً تازه، په سلادونو کې یا د نورو سبزیجاتو سره یوځای خوړل کیدی.

د تراتیژیکو ناروغۍ او تداوی:

سمبول	د کرنې اړخونه	طریقه
	د تخم د کرلو وخت	• لومړنۍ کر: د مارچ منځنۍ میاشت • دوهم کر: د جولای میاشت • دریم کر: د سپتمبر میاشت
	د لیکو تر مېنځ واټن	• له ۱۵ تر ۲۰ سانتي متر
	د دوچو تر مېنځ واټن	• له ۱۵ تر ۲۰ سانتي (له ۴ تر ۵ انچ)
	د کرلو ژوروالی	• له ۳ تر ۵ سانتي متره (د خاوري د ټول له مخې؛ په نرمه خاور کې ژوره، په نسبتاً سختې خاوره کې سطحی ژوره).
	د پخیدو وخت	• له ۳۰ د کټ څخه تر ۶۰ ورځو وروسته • لومړی حاصل کولای شي په درېیمه یا لومړمه اونه کې پیل شي.
	د ضرور وړ اندازه تخم	• له ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرام تخم په ۱۰۰ متر مربع کې
	د خاور پی اچ	• له ۶.۵ تر ۷.۵

له ککټ مخکې له ۳ تر ۵ تنه کمپوس یا حیواني سره	طبیعی سره	
د کرلو په وخت کې له ۳۰ تر ۴۰ کیلو ګرامه توره سره د وکارول شی.	توره سره	
- د ککټ د لای پر لای کولو وروسته (شاوخوا له ۲ تر ۳ اوونیو وروسته) ۲۵ تر ۳۰ کیلو ګرامه یوریا ورکړئ. - د سر په تدریجی ډول ورکول غوره دی: لومړی ۱۵ کیلو ګرامه، بیا دوه اوونۍ وروسته له ۱۰ تر ۱۵ کیلو ګرامه. - همداشه د یوریا د کارولو وروسته خاور ته اوبه ورکړئ ترڅو د حساسو نباتاتو سوځېدنې مخه ونیول شي.	یوریا (سپینه سره)	
د ودې لپاره مناسبه تودوخه د ۱۰ نه تر ۲۰ درجې ده.	اقلیم	
فایبروسی او لږ ژور ریږ.	ریږه یی سیستم	
- تخمونه په مستقیم ډول پر چمتو شوې خاوره باندې وشیندل شی. - خاوره باید نرمه، ژوره او د اوبو د جذب وړتیا ولري. - سخته خاوره کولی شي د ریږو د مناسب ودې مخه ونیسي.	د کرلو طریقه	
- د اوبو مقدار او وخت د لای شرایطو پورې تړلی. په هغو سیمو کې چې کافي باران وي، د اوبو لټولو اړتیا کمه ده، خو په وچو سیمو کې اړینه ده چې اوبه لټول د صحیح پلان سره سم ترسره شي. - اوبه لټول باید هر ۵ ورځې وروسته ترسره شي.	آبیاري / اوبه ورکونه	
- تره تیزک باید هغه وخت راټول شي کله چې تخمونه په بشپړ ډول رسېدلي وي او رطوبت یې شاوخوا له ۱۶-۱۴ وي. - په دې پلاو کې، تخمونه کلک او وچ وي او په اسانۍ سره بېلېدای شي. - په راټولولو کې د تخمونو له منځه تللو او د حاصل کمېدو لامل کېدای شي.	د حاصل راټولول او ذخیره کول	 
په هر جریب کې د کرنې په هر پلاو کې له ۸۰۰۰ تر ۱۲۰۰۰ کیلو ګرامه (یا ۸ تر ۱۲ ټنه)	د حاصلاتو اندازه	

ناروغی / آفت	درملنه	انځور
سپین رنځه کپک: د پاڼو په لاندې نیو برخو کې د ژڼې - شین یا سپینځي نځانونو وده.	• هوا ته وده ورکول، له اوبو ورکولو څخه ځکه وکول او که اځتیا وی د فنډس ضد درمل وکارول.	
سپین پوځر: د پاڼو پر سر سپین پوځري ټوله لیک	• د نبات خرابې شوی برخې لږ او له منځه یوښودل، د هوا جریان ځکه کول او که اځتیا وی د فنډس ضد مواد وکارول.	
نرمه بکتریایی خرابي: د ټټوونو او پاڼو نرم او لمد ځه ساحه چټک چپه کول.	• ککړ نباتات له منځه یوښودل، د زیاتو اوبو له ورکولو څخه ځکه وکول او د اوبو ټاټکي ځه منظم کول.	
انترکوز: په پاڼو او ټټوونو باندې تیاره او ژور زخم.	• د نبات ککړ برخې لږ او ختم کول، د فنډس ضد درمل وکارول او حفظ الصحة مراعت کول.	

گشنیز / داځيا:

د گشنيز / داځيا سبزی خوشبويه او ځوره سبزی ده چې په ځوله نښه کې کرل کېږي. پاڼې، ښو او تخم يې په خوړو او دوا کې کارول کېږي.



د گشنيز تخم د خوړو هضم، د بدن ټواک لوړولو او د نس نرموالي او د کمولو لپاره ښه ور دی. دا بوټی هم تازه او هم د پوړ په بڼه په خوراکنونو کې کارول کېږي.

گشنيز يو مخکینی نبات دی او له ميلاد مخکې له شاوخوا ۱۵۰ کلونه راهيسې د خوړو او دوا لپاره کارول شوی دی. د دې تخم لا هم داسې


د گشنيز / داځيا د کرلو طريقه: اسانگونه جوړوي



طريقه	د کرنې اړخونه	سمبول
- معتدل ځای سيمه: د پسرلي شروع يا د مني موسم - ږمسير/نيمه ږمسير سيمه: د اکتوبر نه تر نومبر پورې	د تخم د کرلو وخت	
له ۱۵ تر ۲۰ سانتي متر	د لیکو تر مېنځ واټن	
له ۳۰ سانتي متر (۱۲ انچ)	د دوچو تر مېنځ واټن	
له ۱،۵ تر ۲،۵ سانتي متر (له ۰،۵ تر ۱ انچ)	د کټ ژوروالي	
له ۹۰ تر ۱۰۰ ورځو (د دې ځول او هوا په نظر کې نيولو سره)	د پخيدو وخت	
په هر هکتار کې له ۱۰ تر ۱۵ کیلو ګرامه (د ځای وده لپاره، د پوستکي نه لرونکي او مات شوي تخمونه د استعمال توصيه کېږي).	د تخم د ضرورت و مقدار	
له ۶،۵ تر ۷،۵ (له خنثي خاورې تر ځایي)	د خاورې پی اچ	
د کرلو ځه مخکې په هر هکتار کې له ۵ تر ۱۰ ګانو پورې کمپوست يا حیواني سره وکارول شي	طبیعی سره	
په هر هکتار کې د کټ پر مهال ۱۰۰ کیلو ګرامه تطبیق شي.	توره سره	

• سپینه سره په دوو پلاوونو کې په هر هکتار کې ۵۰ کیلوگرام تطبیق شی؛ نیمایی یې د کټ پر وخت او بله نیمایی یې د کټ څخه ۳۰ ورځې وروسته.	یوریا (سپینه سره)	
• مناسبه تودوخه: له ۱۵ څخه تر ۲۵ درجې سانتیگراد پورې • لږ تر لږه تودوخه: لږ یخ زغملای شی، خو سخت یخ کولای شی ریلو ته زیان ورسوی. • اعظمی تودوخه: له ۳۰ درجې سانتیگراد څخه لوړه تودوخه کولای شی د ریلو د کمزورې جوړښت او د هغوی د خوند ترخیدلو سبب شی.	مناسب اقلیم	
• د ژورو ریلو سیستم (شنه ریله) د نړیو لاندې ریلو سره	ریله یی سیستم	
• تخمونه په لاس باندې پر خاوره وشیندئ او بیا یې په احتیاط سره د یو څنډکې بېل په مرسته پر هغو خاوره برابره کئ.	د کرلو طریقه	
• د اوبو ورکولو تیا له ۳ تر ۴ ځله ده: • لومړۍ اوبه ورکول سمدلاسه وروسته له کرلو • راتلونکې اوبه ورکونه له ۱۵ تر ۲۰ ورځو پورې د خاورو ټول او د هوا د شرایطو له مخې ترسره کیږي.	آبیاری / اوبه ورکونه	
• پاتې له کرلو وروسته له ۳۰ څخه تر ۴۵ ورځو پورې راټولېږي. • د تخمونو د راټولولو لپاره، کله چې د بوټی زیاتره برخې ژيږي شي او تخمونه وچیدل پیل کړي، راټولول ترسره کیږي. • بوټی د حاصلاتو د راټولولو مخکې پرې کیږي او په سیوري کې وچېږي.	حاصل راټولول او ذخیره کول	
• شنې پاڼې: په هر هکتار کې له ۵ تر ۷ ځله • تخمونه: په هر هکتار کې له ۷۰۰ تر ۱۲۰۰ کیلوگرامه	منلنې حاصل	

ناروغ، آفات او د هغوی تداوی:


ناروغی / آفت	درملنه	انځور
د بکتریاوو لېبندی		
د پاڼو پر سر د باکتریا داغونه	- د گشنیز بولۍ په داسه خاورو کې وکړئ چې د اوبو جذبولو وړتیا ولري. - اجازه ورکړئ چې بولۍ د بیا اوبه کولو مخکې وچ شي. - د بولۍ د زیانمنیدو مخنیوی لپاره د حاصل اخیستو په وخت کې له ځپولو څخه وکړئ څو د حاصل وروسته ناروغ وده ونکړي. - ټول تجهیزات په منظم ډول ضدغفوني کړئ.	
د ویروسي ناروغیو لېبندی		
د لارو ویروسي لیک یا خالونه	هغه کروند چې د ژمی له خوا پکې لارې پاتې شوي وي، په داسه نښه ساحو کې د گشنیزو له کرلو څخه وکړئ.	
د فنلېسي ناروغیو لېبندی		
میوه یی بولۍ	- په هغو خاوره کې چې اوبه نه جذبوي، یخ او نمجنه وي، له کرولو څخه وکړئ. - په لوڼو ساحو کې یې کرنه دا مرسته کوي چې خاور ته د اوبو جذب ډېر شي. - له لوڼو کیفیت لرونکو تخمونو چې ژر وده کوي، استفاده وکړئ. - د تخمونو د کرولو مخکې له فنلېسي ضد موادو سره یې درملنه وکړئ څو د فنلېسي ناروغیو عوامل له منځه لاړ شي.	
د حشراتو لېبندی		
حشر (کهنه) (د لارو کهنه - بید کهنه)	- که دغه حشر / کهنه یوازې په ځو پاڼو یا ځانځو محدود وي، نو د ځو برخو پر ځو کولو سره آفت کنټرولیدي شي. - مخکې له دې چې ځوانه ونه انتقال کړي، ځان ترلاسه کړئ چې حشر یا کهنه پکې نشته. - که ممکن وي، د نباتاتو بېلابېل ځولونه وکړئ.	
للیز چینجی	- د ډلیرزو چینجیو د طبیعي کنټرول لپاره د طبیعي دوښمنانو له لارې بیولوژیکي کنټرول شامل دی چې لارو پرازیټي کوي او د <i>Bacillus thuringiensis</i> کارول هم پکې شامل دي. - د سوداګریزې کنټرول لپاره کیمیاوي مواد شتون لري، خو ډیری هغه چې د کورني باغونو لپاره موندل کېږي، د لارواوو د کنټرول په برخه کې ډیر اغیزناک نه دي.	

ملی سرخک:

- ملی سرخک یو کلنډ بوټی دی چې له B1، B2 او B3 ویدامینونو څخه ټک ده. ملی سرخک د پوټاشیم، فاسفورس، کلسیم او سوټیم له سرچینه ده. د خوړو د ټو سربرېره، ملی سرخک درملنه ټټ هم لری او د پوستکی لپاره ټټور دی او د هغ د رطوبت په ساتلو کې مرسته کوی.



طریقه	د کرنې اړخونه	سمبول
	• له فیبروی تر مارچ	
	• له ۱۵ تر ۲۰ سانتي متره	
	• له ۵ تر ۷ سانتي متره	
	• له ۱.۵ تر ۲ سانتي متره	
• وختی اچول شوی ټولونه یې له ۳۰ تر ۴۰ ورځو پورې پخیدلی. • ناوخته کټ کیدونکی ټولونه ممکن له ۵۰ تر ۶۰ ورځو پورې وخت ته اټیا ولری.	• د پخیدلو وخت	
• په هر جریب کې له ۱ کیلو ټرام (نډد ۲۰۰۰ متره مربع)	• د کرلو لپاره د تخم اټین مقدار	
• له ۶۰۰ تر ۷۰۰ پورې (نسبتا تیزابی تر منډ)	• د خاورې پی اچ سطحه	

• د سټو هوا سبزیجات له ۱۲ تر ۲۵ درجې سانتي ډگراد تودوخه کې غوره وده کوي • په سټو سيمو کې د اپريل په مياشت کې کرل کېدای	د کټ وخت يې	
• د خاورې د چمتو کولو په وخت کې د هر جريب لپاره له ۸ تر ۱۰ ښه عضوی سره وکاروئ.	طبیعی سره	
• له ۴۰ تر ۵۰ کيلوگرام في جريب	توره سره	
• له ۳۰ تر ۵۰ کيلوگرام في جريب	يوریا (سپينه سره)	
• د ودې لپاره مناسبه تودوخه له ۱۰ څخه تر ۲۵ درجې ده .	مناسب اقليم	
• ريښې يې اصلي محور دی چې سره د ملي سرخک د خوږو برخو ته رسيدلی. • د ريښو د ښو وده لپاره نرمه خاورې او د اوبو د ساتلو وړتيا ته اړتيا لري.	ريښه يې سيستم	
• د کتارونو تر منځ واټن: ۳۰ سانتي متره • د بوټو تر منځ واټن: ۱۰ سانتي متره	د کټ يا کرلو طريقه	
• له هرو ۵ تر ۷ ورځو پورې په ورځ کې يو ځل	آبياري / اوبه ورکونه	
• له ۲۰ تر ۴۰ ورځو وروسته کرلو	د حاصلاتو راټولول او ساتل	
• د ملي سرخک حاصل په منځنۍ کچه په هر جريب کې له ۸۰۰۰ څخه تر ۱۰۰۰۰ کيلوگرامو پورې (توپير لري چې د ډډول او د اداره کولو د طريقې په اساس مختلف وي) دی.	د حاصلاتو اندازه	

د ملی سرخکو ناروغۍ / آفات او د هغوی درملنه:

ناروغی / آفت	درملنه	انځور
د فڼۍ سونو ښېندې:		
د آلترناریا ناروغی	- د تصدیق شوی، معیاری او له ناروغیو پاکو تخمونو څخه استفاده وکړئ. - له کرنۍ مخکې تخمونه په ډرمو اوبو ومینځئ. - د براسیکا له کورنۍ پرته نور نباتات وکړئ ترڅو د کرنیز تناوب رعایت شوی وي. - نباتاتو ته اوبه ورکول د سهار په ساعتونو کې وکړئ ترڅو د وړ ځای په اوږدو کې د وچۍ فرصت ولري. - د فڼۍ سونو مناسب او ضد مواد وکاروئ.	
نرم کپک	- د حاصل اخیستلو څخه وروسته، ډول اضافي نباتات له ځمکې پاک کړئ. - د براسیکا له کورنۍ پرته د نورو نباتاتو کېت کولو سره د کرنې دوره تعقیب کړئ. - د مناسبو فڼۍ ضد درملو کارول کولی شي د زیان رسوونکي په کنټرول کې مرسته وکړي.	
فوزاریوم یا د پاڼو ژبې والی	- د ملی سرخک د ښه لاملونو مقاومت لرونکو ډولونو د کرلو سره، کولای شو د ناروغۍ مخه ونیسو. - کله چې د ناروغۍ عامل مستقر شي، کنټرول یې ستونزمن کړئ. - د وسایلو د ضد عفونی کولو سره، کولای شو د ناروغۍ خپرېدو مخه ونیسو. - هغه څوک چې د ناروغۍ ته حساس دی باید په مخکې له مخکې ککړو خاورو کې ونه کرل شي.	
د بکتریا ښېندې		
د ریلو توریدل	- د ملی سرخک د مقاومت لرونکي ډولونه وکاروئ. - د براسیکا له کورنۍ پرته د نورو نباتاتو په کرلو سره د کېت د تناوب دوره مراعت کړئ.	

کدو:



کدو یوه ښه سبزی ده چې په ښه سیمو کې کرل کېږي. دغه نبات د تاک په شکل وده کوي او ژوند یې لنډ دی، عموماً یوازې یو فصل ژوندی پاتې کېږي. د کدو پاڼې لویې او پراخې دي او ښلان یې ژيې یا نارنجي رنګه دي. کدو د اندازې له مخې توپیر لري؛ ښه کوچني وی او ښه ښه ر لوی شي، حتی له ۳۴ کیلو څخه زیات وزن لري. د کدو پوستکي رنګ ښه ښه وخت نارنجي وي، خو کله نا کله شین، ژيې، سور یا ځمکه هم لیدل کېږي. که شرایط ښه وي، ښه تر ۱۵ مترو پورې وده کوي. کدو زیاتره د خوړو لپاره او ښه وخت د ښه لپاره هم کرل کېږي.

د کدو د کرلو طریقه:

طریقه	د کرنې اړخونه	سمبول
- د پسرلي فصل (د یخ بندان وروسته) یا د باران موسم، د سیمې په اقلیم پورې اړه لري. - په افغانستان کې غوره وخت: له دلوی تر ثور میاشتې یا له سرطان تر اسد میاشتې	د کرلو وخت	
له ۲ تر ۳ متره (کدو ته ښه رڼا پکار دی).	د لیکو تر مېنځ واټن	
له ۱ تر ۲ متره	د دوچو تر مېنځ واټن	
له ۱.۵ تر ۲ سانتي متره	د کټ ژور والی	
د کرنې وروسته له ۹۰ تر ۱۲۰ ورځو پورې (د تخم د ښول په نظر کې نیولو سره)	د پخیدو وخت	
له ۲ نه تر ۳ کیلو ګرامه په هکتار کې	د تخم اټیا و اندازه	
د ۶،۰ نه تر ۷،۵ پورې (له حنثی تر نسبتاً ټیټ زابې)	د پی اچ خاور سطح	

• د سلو فصل سبزیجات • له ۱۲ تر ۲۵ درجه سانتی یراد تودوخه که غوره وده کوی • په سلو سیمو که د اپریل په میاشت که کرل که یی	د کلت وخت	
• په هکتار که د کرنه د مخه له ۲۰ تر ۲۵ ښه خوسا شوی حیوانی سره	طبعی سره	
• په هر هکتار که د کلت پر مهال له ۱۰۰ تر ۱۵۰ کیلو یرامه	توره سره	
• د نبات د ود په مرحله که په دوره یی ول له ۸۰ تر ۱۰۰ کیلو یرامه سره؛ یو ول د تاکنونود ود په وخت که او دویم ول د لرونو د تولید په وخت که	یوریا (سپینه سره)	
• له ۲۰ تر ۳۰ درجه سلسیوس. د د وده په هغه تودوخه که چ له ۱۵ کمه او یا له ۳۵ څخه زیاته وی کمی یی	اقلیم	
• دا قوی اصلی ریه او پراخه جانبی اضافی ریه لری. خاوره باید ژوره، حاصلخیزه او ښه وی.	د ریه سیستم	
• تخمونه یی باید مستقیم په اصلی ښکته که وکرل شی (د ول یا کند کولو له طریقه). خاوره باید د شلو او ځو مخلوط وی، کافی عضوی مواد ولری او د اوبو د جذب ظرفیت ولری.	د کلت طریقه	
• له کرلو سمدستی وروسته اوبه ورکه یی. • د ود په جریان که منظم ول اوبه ورکول، په ښه ول ول د لانو او مڼو د جوړیدو په وخت که؛ په هرو ۷ تر ۱۰ ورځو که. • د لرو اوبو ورکولو څخه ښه وکه یی.	آبیاری / اوبه ورکونه	
• کله چ د مڼو پوستکی کلک شی او د مڼو رنځ (ژو، نارنجی یا شین، د ول له مخه) وروستی رنځ ته بدل شی • د کرلو څخه له ۹۰ تر ۱۲۰ ورځو وروسته • د راولولو پر وخت، په مڼو پسه باید له تانځ پاته شی • په یخ او وچ لای که باید وساتل شی. • په مناسبو شرایطو که، کدو له ۲ تر ۳ میاشتو پور ساتل کیدای شی	د حاصل را ولول او ذخیره کول	
• د هر هکتار لپاره له ۲۰ تر ۳۰ ښه حاصل اخیستل کیدی شی – که ښه مدیریت یی وشي، دا مقدار کیدای شی زیات شی	د حاصلاتو اندازه	

د ډرډ څپرول




د ډرډ څپرول هغه وخت ترسره کيږي کله چې ډرډه د نارينه نبات ډل څخه د ښځينه نبات ډل ته انتقال شي. دا پروسه معمولاً د حشراتو لکه د شاتو مچيو لخوا ترسره کيږي. ډول نباتات د ميوو او تخم د توليد لپاره د ډرډ څپرولو ته اړتيا لري.

کدو ښځينه د حشراتو او مچيو پواسطه ډرډه افشاني کيږي؟

د ډرډ څورولو لپاره، کدوان په هغو حشراتو متکي دي چې ډرډه انتقالوي، په ښځينه ډول د شاتو مچي. مچي کله چې د نرو ښځينو دوره کوي، ډرډه راټولوي او د شاتنډ پلو سره يې ښځلوي او په ښځينه بوجيو کې چې د ډرډو کېو په نوم ياديږي ذخيره کوي. کله چې له يوه ډل څخه بل ته ځي، ډرډه ښځينه ښځلوي ته انتقالوي. دا پروسه د ډرډو ورکولو په نوم ياديږي او د ودې او مړېدو لپاره اشد ضروري ده.

د شاتو د مچيو له لارې د ډرډه اچونې ډرنډوالی




- د کدو نبات نارينه او ښځينه ډلان جلا جلا خو په يوه بوټي کې توليديږي.
- ډلان د سهار په لومړيو ساعتونو کې خلاص کيږي.
- مچي او نور حشرات د خوږه شږه (نکتار) راټولولو لپاره د نارينه ښځلوي خوا ته ورځي او په دې جريان کې ډرډه هم له ښځانه سره وځي.
- بيا حشره د ښځينه ډل خوا ته ځي، چې د ډل پر شاتنډ پاڼو کې يې کوچنۍ غده (ميوه) ليدل کيږي.
- په همدې وخت کې، ډرډه د نارينه ډل څخه د ښځينه ډل مېهر (سپيډما) ته انتقالوي.

په کدو کې د مذکر او مونث ځل تشخیصول:


د کدو مونث ځل	د کدو مذکر ځل
• دا په لنډه او غوښینه ساقه کې وده کوي. • د ځل په بلخ کې یوه کوچنۍ ښځه (کوچنۍ کدو) لیدل کیږي چې د ځل تخمدان دی او که چلر ځړده افشانی بریالۍ شي، میو ته بدلیږي. • د ځل په دننه کې، یوه مرکزي غوښه شته چې مهر ښه (سپیڅما) بلل کیږي. • عموماً د پاڼو لاندې پټ وي او په آسانۍ سره نه لیدل کیږي. • د نارینه ځلونو په پرتله وروسته پرانیستل کیږي.	• په نری او مستقیم ځول وده کوي او د ځل په بلخ کې هیڅ ځول غځه یا کوچنۍ مڼه (پښوب) نه لیدل کیږي. • د ځل په دننه کې یوه برخه شته چې stamen نومېږي او له ځرد څخه ده. • دا ځلان د ځښینه ځلو په پرتله ژر او زیات ځړندیږي. • اصلي موخه یې د ځښینه ځلو د ځړده افشانی لپاره ځړده تولیدول دي.

د کدو ځل جوړښت

ښراغ: نارینه برخه ځل
 بساک: هغه ځای چې ځړده پکې تولیدیږي
 نخ له بساک سره یو ځای
 ښلول شوی دی



مذکر ځل



مونث ځل

کلاله: چې ځړده ترلاسه کوي.

تخمدان چې وروسته مڼو ته بدلیږي.

د کدو د لاندو د برد خپرولو د لاس په وسیله ښه کولی؟

- که ستاسو په سیمه کې د برد خپروونکي حشرات او مچې کم وي، نو تاسو کولی شئ د لاسي برده افشاني له لارې د کدو (او حتی هندوا) محصول زیات او تولید او حاصلات زیات کړئ.
- لومړی، لاند تر لاسه کړئ چې نارینه او ښه لاندې لاند خلاص دي. هغه لاند چې پام وړ ښه لاندې وي لا هم د برده افشاني لپاره چمتو نه دي، نو تېل شوی پام ته زور مه ورکړئ.
- یو نارینه لاند انتخاب کړئ او ورو ورو یې راولول کړه. بیا د لاند پام وړ ښه لاندې ته ښخ ته ښخ کړئ چې بیرغ ښکاره شي.
- دا به د برده افشاني پروسه اسانه کړي او د ښه لاندې لاند ته به زیان و نه رسېږي.





