



د کرنې او وترنري د لیسو او انسټیټوټونو لپاره مرستیال درسي مواد

د مچيو د روزني بنسټيز مهارتونه

د کرنيزو زده کړو پروگرام

د پښتو موسسه (PIN) People In Need

د چک جمهوریت

2016

د زدکړې دا مواد د افغانستان د کرهڼې په مسلکي لیسو او انسټیټوټونو کې له اړونده چارټونو سره په ټولګیو کې د درسي مرستیالو موادو په توګه او په ځانګړي ډول د شاتو د مچيو د روزني په برخه کې په عملي ډول کارول کېږي

څېړندویه موسسه: پښتو (PIN)

www.peopleinneed.cz

د چک جمهوریت د پراختیایي ادارې په مرسته

لړليک

مخ	عنوانونه
01	پېژندنه
01	موخي او وړتياوي
02	د مچيو د روزني بنسټيز اصطلاحات
03	د مچيو د روزني پېژندنه او موخه
03	د مچيو روزنه څه ده؟
03	په افغانستان کې د شاتو د مچيو نسلونه
04	د شاتو د مچيو د دندو طبقه بندي
05	د مچيو د روزني لپاره لومړني اړين شرطونه
07	د مچي روزني پيلول
07	د مچيو د روزني لپاره د ځای ټاکل
08	د مچيو لپاره په مصنوعي ډول د اوبو چمتو کول
09	د صندوقونو کتنه
10	د شاتو د مچيو د کالوني تغذيه
10	د شاتو د مچيو تغذيه د بورې په مرسته
10	لومړی د بورې د شربت جوړول
12	د شاتو د مچيو د کالونيو ليردول
12	د شاتو د مچيو ليردول ليري ځای ته
13	د شاتو مچيو د کالونيو ليردول نږدې واټن ته
13	د نوې ډلې يا د نوي کالوني تشکيليدل
13	په طبعي ډول په کالوني کې د گروپ جوړيدل
14	په مصنوعي ډول د نوې ډلې تشکيلول
16	د شاتو د مچيو د کالونيو يو ځای کول
15	د شاتو د مچيو د صندوق پر سر د صندوق ايښودل
16	ژمنی چمتو والی
17	د مچي روزني تجهيزات او د هغوي د کارولو موارد
19	د مچيو د روزني موسمي کړنې
20	د مچيو د روزني له ستونزو او ناروغيو سره مجادله
20	د شاتو د مچيو ساتنه د وحشي مچيو له حملي څخه
21	د وروا کنه
24	امريکايي فولبروډ
25	د اروپايي لوک ناروغي
26	موم خورونکي چينجي

د مچيو د روزني بنسټيزې وړتياوې

پېژندنه:

د مچيو د روزني بنسټيزې وړتياوې د افغانستان د کرهڼې او وترنري د لیسو او انسټیټوټونو د ښوونکو، زده کوونکو او بزگرانو لپاره د زدکړې نوي مواد دي چې د پښتو موسسې د کرهڼیزو ښوونو د ټیم لخوا چمتو شوي دي. د کرهڼیزو ښوونو د ټیم لخوا د بنسټیزو وړتياوو نور مواد هم چمتو شوي چې عبارت دي له:

- د ښوونیزو بنسټیزو وړتياوو/مدیریت/پیوند او د څانگو غوڅول
 - د تجارت بنسټیزو وړتياوو
 - د چرگانو د روزني بنسټیزو وړتياوو
 - د شنوڅونو د مدیریت بنسټیزو وړتياوو
- بنسټیزې وړتياوې له هغو فکت شیتونو او ښوونو څخه عبارت دي چې د ترینرانو لخوا په تریننگونو کې کارول کېږي او استادان هم په تدریس کې له دې موادو څخه کار اخلي.

د موخې وړگروپ:

- د کرهڼې د لیسو او انسټیټوټونو نارینه او ښځینه زده کوونکي
- بزگران او کورنۍ یې
- کلیوالي وزگارې کورنۍ.

عمومي موخې:

د مچيو د روزني په برخه کې د کرهڼې د لیسو او انسټیټوټونو د استادانو د ظرفیت د لوړولو لپاره چې څنگه کولی شي په خپله سیمه او نورو ځایونو کې چې وغواړي د شاتو د مچيو کوچني او منځني فارمونه پیل کړي او په دې برخه کې خپل زده کوونکي په عملي ډول تشویق کړي.

د زده کړې ځانگړې موخې:

ددې درس مرستیالو موادو په لوستلو به لوستونکي وکولی شي:

1. د مچيو د روزني په اهمیت (دمچيو تولید او په ونو او نباتاتو کې د گردې شیندنه) او په افغانستان کې د مچيو د روزني په اوسنۍ وضعیت پوه شي. (د مچيو د روزني کوچني او لوی روزونکي به وکولی شي چې څرنگه له ټکنالوجۍ څخه کارواخلي)
2. د مچيو د ساتنې لپاره مناسبه سیمه وپېژني (د گل اړتیا او د مچيو د ساتنې لپاره د تغذیې او تودوخې اړتیا)
3. د مچيو د مصنوعي تغذیې په اهمیت او دلیل پوه شي.
4. د قوي کالونیو د بیلولو او د کمزورو کالونیو د یوځای کولو وړتیا ترلاسه کړي.
5. د شاتو د مچيو د فعالیتونو په مهال ویش او په افغانستان کې د مچيو د روزني په موسمي عملیاتو پوه شي.
6. په ټاکلو سیمو کې د شاتو د مچيو د اړتیا وړ نکتار او گردې د راټولولو لپاره د مختلفو ونو او نباتاتو د گل کولو مهال ویش چمتو کړي.
7. د ماشین پواسطه د شاتو ایستلو او نورو سامانونو او تجهیزاتو د پیژندلو او کارولو وړتیا ترلاسه کړي.
8. په افغانستان کې د شاتو د مچيو د مهمو ناروغۍ او ستونزې وپېژني او څرنگه د ناروغیو مخنیوی، تشخیص او درملنه وکړي.

وړتياوې:

د تریننگ په پای کې به ګډونوال وکولی شي چې:

1. څرنگه کولی شي د اړتیا وړ گلانو او د شاتو د راټولولو لپاره مناسبه سیمه وټاکي
2. څرنگه خپلو مچيو ته مصنوعي خواړه ورکړي؟

3. څرنګه په صندوق کې موم لرونکی چوکاټونه کېښودلای او د شاتو ایستلو ماشین وکاروي؟
4. څرنګه د شاتو د مچيو صندوقونه له یوې سیمې څخه بلې ته ولېږدوي. څرنګه د مچيو کورنۍ تقسیم او تکثیر کړي؟
5. په عملي ډول د خپلو مچيو ناروغۍ تشخیص کړي. د لوګي د پمپ په کارولو او د دواګانو په تطبیقولو پوه شي
6. د کالونۍ په روغتيايي حالت پوه شي. د ناروغیو تشخیص او د لوګي د پمپ د عملي کارولو وړتیا ولري.
7. د ژمي د تیږولو لپاره خپلې مچۍ چمتو کړي.

د مچيو د روزنې بنسټيز اصطلاحات

مچی (Bee): هغه حشره ده چې د اپویدیا (Apoidea) په فامیل پورې تړاو لري. کله چې د شاتو د مچيو په روزنه خبرې کوو، دا اصطلاح د شاتو په مچيو پورې اړه لري.

د شاتو د مچيو بچي (Brood): دا اصطلاح د نابالغو مچيو مختلف پړاوونه بیانوي. هګۍ، لاروا او شفیره

د بچيو خاله (Brood nest): د کالونۍ چوکاټونو ته وايي چې ملکه په هغه کې هګۍ اچوي او بچي د کارګرو مچيو لخوا روزل کېږي.

د شاتو د مچيو کالوني (Bee Colony): د شاتو مچۍ ټولنیز ژوند لري چې یوه کورنۍ یا کالونۍ تشکیلوي او غړي یې ملکه، کارګري او نارینه مچۍ دي.

واړه جوړښتونه یا کورونه (Comb): دا واړه جوړښتونه شپږ ضلعي دي چې د هګۍ اچونې یا د کارګرو مچيو پواسطه د شاتو د ذخیره کولو لپاره جوړ شوي دي.

د مچی موم (Bee wax): موم د شاتو د مچيو پواسطه تولیدیږي او ږمنځو په جوړولو کې کارول کېږي

د شاتو د مچيو جنس (Apis): یوه لاتیني کلمه ده چې د مچيو د جنس لپاره کارول کېږي.

د شاتو د مچيو د ایښودلو ځای (Apiary): هغه ځای ته ویل کېږي چې د شاتو مچۍ په څرخای کې د شاتو د راټولولو لپاره ایښودل کېږي.

د شاتو د مچيو کندو (Bee hive): هغه ځانګړی شوی جوړښت دی چې د شاتو د مچيو ډولونه پکې ژوند کوي او خپل بچي پکې روزي.

چوکاټ (Frame): یو لرګین مستطیلي جوړښت دی چې د صندوق د ننه د موم پانې ورباندې نصبیږي.

د موم بنسټ (Foundation): د موم یوه لوحه یا پانه ده چې واړه جوړښتونه ورباندې شته او د خالي د جوړولو لپاره چمتو شوی وي او په لرګین چوکاټ کې نصبیږي.

د خوړو لوبښی (Feeder): هغه وسیله ده چې د خوړو د کمښت په مهال مچيو ته د شکرې د شربت د ورکولو لپاره په صندوق کې کارول کېږي.

پاسني صندوق یا سوپر (Super): له هغه صندوق څخه عبارت دی چې د شاتو د ذخیره کولو لپاره د بچيو د صندوق پر سر ایښودل کېږي.



د مچيو د روزني پيژندنه او موخه

د مچيو روزنه څه ده؟

د مچيو روزنه د افغانستان د کرهني يوه لويه برخه تشکيلوي او کولی شي د بزگرانو پر اقتصادي وضعیت مثبتې اغيزې ولري. په داسې يو هيواد کې چې له ۸۰ سلنې زيات وگړي يې په کرهني تکيه لري. هر بزگر کولی شي مچۍ وروزي، مهمه نده چې ځمکه ولري او که نه ځکه چې آسانه او لږ لگښت لري. هغه بزگران چې ځمکه نه لري هم کولی شي مچۍ وروزي. د مچيو روزنه يوه ساده کرنه ده چې په لومړي کال کې حاصل ورکوي او توليد يې په نړۍ کې د پام وړ او ښه مارکيت لري. سربيره پردې د بڼ والی تر څنگه د شاتو د مچيو روزنه نورې مثبتې اغيزې لکه گرده شيندنه يې د ميوو د توليداتو پر کيفيت او همدارنگه په نورو کرهنيزو کړنو د پام وړ مثبتې اغيزې لري چې توليدات او کيفيت يې لوړوي. افغانستان د مچيو د روزني لپاره يو مناسب هيواد دی چې ددې لپاره مناسب اقليم او ښه مارکيت لري. نن ورځ د مچيو روزنه داسې يو فعاليت دی چې په کليوالو سيمو کې د کوچنيو کورنيو لپاره د معيشت بديل کيدای شي او خپل ژوند له دې لارې پرمخ بوزي. له بده مرغه په افغانستان کې د مچيو روزنه د دولت لخوا نه حمايت کيږي مگر د ځينو غير دولتي بنسټونو لخوا د تجهيزاتو په برخه کې ورسره يو څه مرسته کيږي. خو بياهم په دې وروستيو کې د مچيو روزني د پام وړ پراختيا موندلې ده، د مچيو د روزني يو شمير کوپراتيفونو جوړ شوي دي او اوس يې د افغانستان نورو برخو ته هم پراختيا موندلې ده، د مچيو روزونکي خپلې مچۍ د ډيرو شاتو د راټولولو لپاره مختلفو سيمو ته ليردوي آن د سرو په موسم کې يې پاکستان او بيا د گرمۍ په مهال هيواد ته راوړي او افغاني شات د لوړ کيفيت درلودونکي او په عربي هيوادونو کې د ښه بازار درلودونکي دي چې په دې برخه کې د مچيو د روزونکو د تشويق لامل کيږي. په افغانستان کې د مچيو د روزني لويې ستونزې عبارت دي له: د مچيو د روزني د فارم ککړيدل په ساري ناروغيو، د مچيو د روزني سامانونو ته د بزگرانو نه لاسرسی او منفي رقابت (هغه کسان چې شات توليدوي يا يې پلوري، په بازار کې ستونزې جوړوي او هڅه کوي چې يو د بل توليدات بې کيفيته وښيي). دا ډول ننگونې په بازار کې د مچيو روزونکو تر منځ د يادونې وړ دي.

په افغانستان کې د شاتو د مچيو نسلونه

افغانستان د شاتو د مچيو په روزنه او د شاتو په توليد کې اوږد تاريخ لري. د افغانستان په ختيځ کې دوه ډوله د شاتو مچۍ د آپيس سيرنا او آپيس دورساتا په نومونو موندل کيږي. آپيس دورساتا د روزني وړ ندي، له دې دوو ډولونو څخه يو آپيس سيرنا دی چې ډيرې کوچنۍ دي او په کال کې تقريباً ۵ کيلو گرامه شات توليدوي. د روزني وړ او په ونو کې د گردې شيندلو لپاره زيات اهميت لري. په دې وروستيو کې د مچيو روزونکو د اروپايي مچيو (ميلفيرا) په روزني پيل کړی دی چې زيات



حاصل لري او په کال کې ۱۰ کيلو گرامه شات توليدوي. که د آپيس ميلفيرا مچۍ داسې ځايونو ته وليږدول شي چې زيات گلان ولري، په کال کې يې توليد ۴۰ کيلوگرامو ته رسيږي. لکه د سيمي مچۍ روزونکي چې خپلې مچۍ د سرو په موسم کې پاکستان او د گرمۍ په موسم کې افغانستان ته ليردوي.



د سیرنا مچيو کورنۍ د تیرو په منځ کې



د آپیس سرینا د کورنۍ بیلگه



د آپیس سرینا کورنۍ د دیوال په سوری کې

د شاتو د مچيو د دندو طبقه بندي: د شاتو مچی یوه ټولنیزه او ګټوره حشره ده چې په یوه کورنۍ کې اوسېږي. د مچيو یوه ځواکمنه کورنۍ یوه ملکه، ۱۰۰ نارینه مچی او ۵۰۰۰ پنځینه یا کارګري مچی لري. د شاتو د مچيو هره کورنۍ د هګۍ، لاروا او نمف درلودونکې ده او د شاتو د مچيو د کورنۍ غړي ځانګړې دندې لري چې لاندې به بیان شي.

د شاتو د مچيو ملکه:



په انځور کې ملکه رنگ شوې ده

د شاتو د مچيو ملکه یوه القاح شوې مچی ده، په یو صندوق کې معمولاً یوه ملکه وي، ملکه د کارګرو مچيو په څیر ده مګر ګیډه یې اوږده ده. د ملکې لومړنۍ دنده له نارینه مچی سره یوځای کیدل دي چې بیا وروسته هګۍ اچوي. مچيو ملکه لویه ګیډه لري چې په یو شواروز کې د ډیرو هګیو د اچولو وړتیا لري. د پسرلي په موسم کې د ۲۴ ساعتونو په موده کې ۲۰۰۰ هګۍ اچوي. د ملکې ساتنه او پالنه د نارینه مچيو لخوا ترسره کېږي. د مچيو ملکه کولی شي تر ۶ کلونو پورې هم هګۍ وچوي او ژوندۍ پاتې شي. مګر د هګیو شمیر یې له ۲ کلونو وروسته کمېږي. د مچيو روزونکو ته وړاندیز کوو چې هرو ۲ کلونو کې خپله ملکه بدله کړي.

د ملکې د تولید پړاوونه: دا جدول د ملکې د تولید ټوله دوره له هګۍ څخه د بلوغ یا هګۍ اچونې پورې راښيي چې په لاندې ډول تشریح شوې ده:

د هګۍ اچونې پیل	د نارینه سره د یوځای کیدو سفر	له خالي څخه راوتل	پیوپا	سر بنده پیوپا	لاروا	هګۍ
په ۲۵ ورځو کې	د ۲۰ یا ۲۴ ورځو په عمر	۱ تر ۱.۵ ورځې	۶ ورځې	۱ ورځ	۵.۵ ورځې	۳ ورځې

کارگری مچی:

کارگری مچی غیر القاح شوې مچی دي چې د هغو د عمر اوږدوالي د هغو له کار سره تړاو لري. د پسرلي په مهال چې د شاتو مچی ډیرې فعالې وي او زیات بچي ولري، نو په دې شرایطو کې کارگری مچی تر ۶ اونیو پورې عمر کوي مگر د ژمني استراحت یا د اوربنتونو په مهال چې ډیر بچي شتون ونلري (په معتدلو سیمو کې) یا د بچیو شمیر لږ وي (په تودو سیمو کې)، د مچیو عمر اوږد او آن تر ۶ میاشتو پورې هم وي. د شاتو مچی په صندوق کې د خپل ژوند په اوږدو کې مختلفې دندې تر سره کوي. د شاتو مچی له زیردینو وروسته تر ۲۱ ورځو پورې په صندوق کې مختلفې دندې ترسره کوي، وروسته له ۲۱ ورځو خپل بهرني فعالیتونه پیلوي چې په لاندې ډول بیان شوي دي:

کارگری مچی او د کارونو مهال ویش یې

د فعالیت ځای	فعالیتونه	د مچی عمر د ورځې په حساب
په صندوق کې دننه	د صندوق او څالو پاکول	له ۱ ورځې تر ۳ ورځو
په صندوق کې دننه	د بچیو تغذیه کول	له ۳ ورځې تر ۵ ورځو
په صندوق کې دننه	ملکي ته د ضرورت وړ خواړه برارول او د کوچنیو لارو ګانو تغذیه کول	له ۵ ورځې تر ۱۲ ورځو
په صندوق کې دننه	د شاتو د ذخیرې او د بچیو د روزنې لپاره د څالو جوړول، د موقعیت ټاکنې الوتنه، د شاتو پروسس او د محافظ دنده سرته رسول	له ۱۳ ورځې تر ۲۱ ورځو
له صندوقه بهر	د اوبو، ګرده او نکتار را ټولونه	له ۲۱ ورځې د عمر تر پایه

نارینه مچی: نارینه مچی د کارګرو مچیو په پرتله پلني او د ملکي په پرتله لنډې دي. د هغو د ګیډې څوکه تیره نه ده. سر یې غټ او سترګې یې په پاسنۍ برخه کې یو له بل سره نښلې. نارینه مچی نښې نه لري، د خوړو د راټولولو وړتیا نه لري او د کارګرو پواسطه خواړه ورکول کیږي. د هغو اصلی دنده له ځوانې ملکي سره یو ځای کیدل دي او مرسته کوي چې د صندوق د منځ تودوخه کنټرول کړي، د خوړو د کمښت په مهال کارګري مچی هغو ته خواړه نه ورکوي او هغه مري او کارګري مچی هغه له ځالي څخه لیرې غورځوي. هغه مهال چې خواړه ډیر وي، کارګري مچی ډیر خواړه راټولوي، کڼو په تیزی سره پراختیا مومي او د نر مچیو شمیر هم زیاتیږي. کله چې کورنۍ لویې شي، هڅه کوي چې نوې کورنۍ جوړې کړي. په صندوق کې د ملکي او نر مچیو شتون د یوې اونی په موده کې ددې فرصت چمتو کوي چې نوې کورنۍ جوړه کړي.

د مچیو د روزنې لپاره لومړني اړین شرطونه

د مچیو د روزنې د فعالیتونو د پیلولو څخه مخکې باید د سختو او ستونزمنو شرایطو وړاند وینه وشي.

- د اقلیم څیرنه: اقلیم د مچیو په روزنه مستقیمی اغیزې لري، نو پکار دي څو د ګلانو شتون، د تودوخې درجه، د اوبو سرچینې، د ګلانو د غوړیدو پړاو، د باد لوری او سرعت، مرغان او وحشي مچی باید وڅیړل شي. د مچیو روزونکي باید وپوهیږي چې پورتنی عوامل د شاتو د مچیو په تولید او روغتیا کې لویه ونډه لري.
- د مارکیټ څیرنه: کله چې موږ ډاډ تر لاسه کړ چې سیمه د مچیو د روزنې لپاره وړ ده، دا هم اړین دي چې پوه شو آیا نږدې مارکیټ زموږ اړتیاوې پوره کولی شي. یعنې اړین توکي لکه بوره، تکمیلی خواړه، د مچی روزنې اړین وسایل او دوا شته او د شاتو د پلورلو لپاره اخیستونکي شته که نه.
- د مچیو د ښو کالونیو ټاکل: ددې لپاره چې یوه بریالی مچی روزنه ولرو، اړینه ده چې یوه روغه او ځواکمنه کورنۍ وټاکو.

- د لگښتونو سنجول: د مچيو د روزني د فعاليتونو پيل لري پانگي ته اړتيا لري نو اړينه ده چې د توکو رانيولو، ترانسپورت، خورو او د مچيو د روزني اړينو وسايل بوديجه و ارزول شي.
- له مچي روزلو سره مينه: له مچي روزني سره مينه د روزونکي لپاره يو شرط دی، هغه کسان چې غواړي د لومړي ځل لپاره د مچيو روزنه پيل کړي، مهمه ده چې د مچيو له مجربو روزونکو سره عملي کار پيل کړي او د مچيو د روزني په برخه کې د دوی له تجربو او مالوماتو څخه کار واخلي او د مچيو د روزني به تريننگونو کې برخه واخلي او دوی ته سپارښتنه کيږي چې د لومړي ځل لپاره له دوو يا دريو صندوقونو سره کار پيل کړي.

په افغانستان کې د ونو د گل کولو وختونه: افغانستان د آب و هوا له مخې بدلیدونکی اقلیم لري، په دې مانا چې د یوې سیمې هوا د بلې سره توپیر لري ځینې سیمې اوږده ژمي لري چې د ونو او نباتاتو پر گل کولو مستقیمې اغیزې لري، دا بدلونونه کولی شي د ونو او نباتاتو د گل کولو وخت ۱۰ ورځې مخکې یا وروسته کړي. مگر د افغانستان ځینې برخې لنډ ژمي او ډیر تود دوبي لري چې دا هم د ونو او نباتاتو په گل کولو او د هغو په شتون او توافق باندې مستقیمې اغیزې لري. لنډه دا چې د یوې سیمې اقلیم له بلې سره توپیر لري او اقلیم پر نباتاتو او ونو مستقیمې اغیزې لري له دې امله د ونو او نباتاتو شتون او گل کول هم توپیر لري. په هر ډول د مچيو د روزونکو لپاره مهمه ده ترڅو د سیمې د ونو او بوټو او هغو سیمو د نباتاتو او ونو په اړه کافي مالومات ولري چې د وی پکې مچي روزي یا یې د زیاتو شاتو د تولید په موخه هلته لیردوي. ددې موضوع د لا روښانه کیدو لپاره د سمگانو ولایت کې شته د ډول، ډول ونو او بوټو د گل کولو مهالونه له تاسې سره د بیلگې په توګه شریکوو. چې د اقلیم له مخې نیم سوړ ژمی لري او د مچيو د روزني لپاره ډیر مناسب دی.

د میوه لرونکو ونو گل کول

د ونو نومونه	د گل کولو نېټه	د گل کولو دوره (د ورځو په حساب)
بادام	د کب د میاشتې پیل	30 ورځې
زردالو	د کب د میاشتې نیمایي	15 ورځې
الوبالو	د کب د میاشتې نیمایي	20 ورځې
شفتالو	د کب د میاشتې په پای کې	15 ورځې
منه	د وري د میاشتې په پیل کې	20 ورځې

وحشي يا غرني بوټي

د بوټو نوم	د گل کولو نېټه	د گل کولو موده په (ورځې)
گل سنگ	د غوايي د میاشتې پیل	30 ورځې
شنشوبی	د غوايي د میاشتې نیمایي	60 ورځې
جیره	د غبرګولي د میاشت په پیل کې	20 ورځې
خوخ	د چنګاښ د میاشتې په پیل کې	60 ورځې

معمولي سابه او نور نباتات

د نبت نوم	د گل کولو د دورې میاشت
شوتله	د وري له میاشتي څخه تر غبرگولي
رشقه	د غوايي له میاشتي تر وري
ختکي، هندوانه، کدو، بادرنگ	د غوايي له میاشتي څخه تر چنگاښ
بینډی	د چنگاښ له میاشتي تر زمري
کنځلي	د زمري له میاشتي تر وري

د ځینې وحشي او تیل لرونکو بوټو انځورونه په لاندې ډول دي:



د مچيو تغذيه کول د شنشوبی د گل څخه



د شنشوبی بوټي په يوه دره کې



گل سنگ د مچيو د تغذیې لپاره یو پیژندل شوی بوټی



کنځله

د مچي روزني پيلول

هغه کسان چې له پخوا څخه د مچيو د روزني تجربه نه لري، بايد له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې زياته تجربه لري، کار وکړي او په دې اړه مالومات ترلاسه او نوټ کړي. د مچيو د روزني په ترينگونو کې دې برخه واخلې، عملي کارونه دې ترسره کړي او د عملي کارونو په لړ کې دې مختلف سوالونه وپوښتي. د مچيو د روزني کتابونه او مجلې دې ولولي او د مچيو د روزني وېديو گانې دې وگوري. د هغو کسانو لپاره چې تجربه نه لري يا لږه تجربه لري، بله سپارښتنه دا ده چې د مچيو روزنه دې له ۲ يا ۳ صندوقونو څخه پيل کړي څو د ستونزو يا د بې خبري له امله تاواني نشي. دوی به په راتلونکي کې د مچيو د روزني له فعاليتونو او ستونزو سره آشنا شي او بيا هر څومره چې غواړي خپله د مچيو روزنه دې پراخه کړي.

د مچيو د روزني لپاره د ځای ټاکل: د شاتو د مچيو د ايښودلو ځای د زياتو شاتو د لاسته راوړلو لپاره ډير اړين او مهم دی. مچي بايد په داسې ځای کې کښيښودل شي چې د نکتار او پولين د راټولو لپاره ډير گلان ولري، که څه هم د شاتو مچي تر درې کيلومترو پورې سيمه تر پوښښ لاندې راوړي، مگر سپارښتنه کيږي چې خپلې مچي د شاتو د راټولو په سيمه کې کښيږدئ تر څو د مچي د الوتلو واټن کم وي، مچي به کمه انرژي ولگوي او ډير توليد به وکړي. د يو مناسب ځای د ټاکلو لپاره لاندې ټکي په پام کې ونيسئ:

- د شاتو د مچيو صندوقونه په داسې ځای کې کښيږدئ چې ډير گلان او دايمي اوبه ولري.
- د مچي د روزني له نورو فارمونو څخه بايد اړينه فاصله ولري. کله چې په سيمه کې گلان ډير وي د ۲ فارمونو ترمنځ واټن بايد ۶ کيلومتره په پام کې نيول کيږي. مگر که په سيمه کې گلان کم وي، په داسې مهال د مچيو فعاليت زياتيږي او د دوو فارمونو ترمنځ واټن بايد ۱۰ کيلومتره په پام کې ونيول شي.
- د مچيو د ايښودلو لپاره يو آرام ځای وټاکئ مگر دا بايد هديرې ته نږدې نه وي.
- ټاکل شوی ځای بايد سړک او د ريل پټلۍ ته نږدې نه وي.
- د شاتو د مچيو صندوقونه بايد په گرم ځای کې و نه ساتل شي او د تودوخي نارمله درجه بايد ۳۵ درجې وي. کله چې د شاتو د مچيو د صندوق د تودوخي درجه لوړه شي، کارگري مچي يا هغه مچي چې نکتار او گرده راټولي، د اوبو په راوړلو بوختيږي او کله چې تودوخه نارمل شي، کارگري مچي د نکتار او گردې په راټولو لگيا کيږي. په هر ډول د صندوقونو د تودوخي د راټيټولو او د لمر د مستقيم وړانگو څخه د ساتنې لپاره بايد د ونو سيوري او شنو سيمو کې کښيږدئ. که د ونو سيوري نه وي، بايد مصنوعي سيوري د مچيو لپاره جوړ شي.
- که په يوه سيمه کې د اوږدې مودې لپاره د شاتو مچي روزل کيږي، په دې حال کې بايد په يوه ځای کې له ۱۰ صندوقونو زياتي مچي مه ږدئ. مگر د لنډې مودې لپاره له ۱۰ صندوقونو څخه د زياتو ايښودل هم کومه ستونزه نه لري. په هغه سيمه کې چې گلان کم وي، مچي روزونکي بايد د صندوقونو شمير په پام کې ونيسي او دا موضوع د گلانو له سرچيني او مچي له روزني سره تړاو لري.



د اوبود نشتون په مهال مصنوعي اوبه چمتو شوي دي



د گل د شتون له مخې د مناسب ځای ټاکل

د مچيو لپاره په مصنوعي ډول د اوبو چمتو کول:

د مچيو په روزلو کې د څښلو اوبه لوی ارزښت او رول لري. د مچيو صندوقونه باید په داسې ځای کې کښيښودل شي چې د مچيو لپاره د څښلو کافي اوبه شتون ولري. که د اوبو سرچینې نه وي، سپارښتنه کېږي چې مچيو ته په مصنوعي ډول کافي اوبه چمتو شي. مچيو ته د څښلو د اوبو د چمتو کولو دوه ليارې شته.

1. د مچيو کندو ته نږدې په سيوري کې د اوبو د لوبښي ايښودل او په منځ کې يې د پاکو لرگينو تختو ايښودل چې په آسانی سره اوبو ته لاسرسی ولري، په اوبو کې غرقې نشي او په آسانی سره والوزي. اوبه باید د مچيو د اړتيا سره سمې وي، د مچيو د اوبو لوبښي باید په هرو ۱۵ ورځو کې پاک او له تازه اوبو څخه ډک شي.

2. اوبه په داسې يو بېرل کې واچوئ چې يو نری پېپ ورپورې تړلی وي، يوه سطحه د پلاستيک پواسطه و پوښي او ورباندې واړه کاني او لرگي واچوئ او د اوبو پېپ ورباندې کښيږدئ او اوبه دڅاڅکو په ډول ورباندې خوشي کړئ ترڅو مچي وکړای شي په آسانی سره د اړتيا وړ اوبه وڅښي، مچيو ته د اوبو چمتو کول په هر موسم کې توپیر کوي، که هوا ډیره توده وي، مچي ډيرو اوبو ته اړتيا لري او مچي د گلانو د گردې پر ځای اوبه راوري. او که هوا سره وي، ډيرو کمو اوبو ته اړتيا وي. د ليکوال د تجربو پر بنسټ د گرمۍ په موسم کېد مچيو ته فارم ته نږدې د اوبو چمتو کول او سيوري ته د مچيو صندوقونو ايښودل د شاتو توليد ۵۰ سلنه زیاتوي.



د تودوخي په موسم کې پر صندوقونو د مصنوعي سيوري جوړول



د شاتو د مچيو د صندوقونو ايښودل د ونو تر سيوري لاندې

د صندوقونو کتنه

د صندوق له خلاصولو څخه مخکې د مچيو د روغتيا نښو ته پام وشي د بيلگې په توگه د کارگرو مچيو پواسطه، د نکتار راوړل، صندوق ته معمولي تگ او راتگ او همدارنگه د ځينو ستونزو معلومول لکه د نورو مچيو په واسطه چورکيدل، د وحشي مچيو حمله او داسې نور کوم چه کولای شي د مچيو کورنۍ د يوې اونۍ په ترڅ کې له منځه يوسي، مطالعه شي. همدارنگه سپارښتنه کېږي چې د مچيو د کالونۍ له څيړلو څخه مخکې بايدخپل لاسونه و ايښي او له ځانه ساتنه وکړي. د اړتيا وړ تجهيزات بايد پاک وي او د هوا وضعيت بايد په پام کې ونيول شي(بايد ډيره گرمي يا ډير ساره نه وي). د صندوق خوا يا شاته ودرېږئ(د صندوق دروازي ته مه درېږئ) په احتياط سره د صندوق سرپوښ ليري کړئ او يو څه لوگی وخت پر وخت پمپوئ. تل مو په یاد وي چې د سرپوښ د ليري کولو په مهال د ملکې له غورځولو يا زخمي کولو مخنيوی وکړئ او د صندوق د خلاصولو په مهال لاندې ټکي په پام کې ونيسئ:



د صندوق د څیرلو په مهال په چوکاتونو کې هګۍ، لاروا، ترلې شفیره او شات لیدل کېږي چې د یوې روغې کورنۍ نښه ده

1. د مچپو د صندوق د ننوتلو د دروازې کتنه چې آیا کارګرې مچۍ د نکټار، ګردې او اوبو د راټولولو لپاره بهر تللي او بیرته راځي؟
2. د چوکاتونو څیرنه (د هګۍ، لاروا او خلاصې او ترلې شفیرې شتون)
3. د خوړو کتل چې آیا په کافي کچه شات د تغذیې لپاره شته که نه؟
4. د ملکي کتنه چې آیا په صندوق کې ملکه شته، فعاله ده، ځوانه ده یا زړه ده؟
5. د ناروغیو کتنه چې آیا د لاروا، موم خوړه چینجې، کنه او داسې نور شته که نه؟
6. د صندوق کتل چې آیا بچي روغتیا لري؟

نوبت: د صندوق له څیرلو وروسته باید هغه ټول تجهیزات چې کارول شوي، ضد عفوني شي ترڅو د راتلونکي کارولو لپاره چمتو وي. د مچپو د روغتیايي معایناتو په مهال یو لنډ راپور د راتلونکو ستونزو د حل لپاره باید چمتو شي.

د شاتو د مچپو د کتنې د ثبت جدول

نېټه	# صندوق	د شاتو د مچپو نفوس			د ملکي حجره		د ملکي هګۍ اچونه			د شاتو ذخیره		
		لږ	منځنۍ	ډیر	هو	نه	ډیر عالي	مناسب	ضعیف	ډیر	منځنۍ	لږ
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
د راتلونکي کتنې لپاره سپارښتنې:												

د شاتو د مچيو د کالونی تغذیه

د پسرلي يا په بل موسم کې د شاتو مچيو طبيعي خواړه نکټار يا شات، ګرده او اوبه دي. مخکې له دې چې ګرده او نکټار شتون ولري، يا هغه مهال چې د مچيو لپاره نوموړي توکي په سيمه او صندوق کې نه وي، د مچيو د ژوندي ساتلو لپاره مصنوعي تغذیه مرسته کولی شي. يا که وغواړو د مچيو شمير زيات کړو، د شاتو توليد به زيات شي او په ونو کې به ګرده شيندنه زياته شي. د مچيو روزونکو ته دا سپارښتنه کېږي چې مچيو ته طبيعي خواړه (شات) ورکړي نه نور خواړه، ځکه چې د شاتو مچي طبيعي خواړه خوښوي. مصنوعي تغذیه د لاندې موخو لپاره ورکولی شو:

1. د مچيو د کالونی تشويقول چې بچي وروزي. د نکټار يا شاتو را ټولول په ځانګړي ډول د ژمي په پای او د پسرلي په پيل کې ډير مهم دي.
2. د کالونیو چمتو کول د ميوه لرونکو ونو د ګرده شيندنې لپاره
3. د خوړو د کمښت يا نشتون د مخنيوي لپاره (لوره).
4. د مچيو روزنکو لخوا د هغو چوکاټونو بيا ايښودل چې شات يې اخيستل شوی وي
5. د مچيو د لوټلو يا ټينټيدلو مخنيوی
6. په خپل وخت کې د مچيو درملنه

د شاتو د مچيو تغذیه د بورې په مرسته

بوره د شاتو د مچيو د تغذيي لپاره وړ او په آسانی سره هر چيرته د لاسرسی وړ ده، د مچيو روزونکو ته ارزان او اقتصادي ده.

لومړۍ د بورې د شربت جوړول:

دا ډول شربت بايد د ايشيدلو اوبو او دانه دارې بورې څخه چمتو کړو چې په لاندې ډول تشرېح شوی دی:

د بورې کچه	د اوبو کچه	د مچيو د تغذيي سبب او مناسب وخت
2	1	غلظ شربت: په عمومي ډول د مني د موسم په پيل يا په ساحه کې د ګلانو د ختميدو وروسته د بورې په مرسته د شاتو د مچيو د تغذيي وخت دی څو پوه شو د ژمي په موسم کې د مچيو لپاره په کافي کچه خواړه ذخيره شوي دي. دا ډول تغذیه هغه مهال ترسره کېږي چې په سيمه کې ګلان ختم شوي وي او د ژمي د تيريدو لپاره کافي خواړه ونلري.
1	1	منځني شربت: ددې ډول شربت سپارښتنه د پسرلي په پيل کې کېږي. چې دا د نکټار په څير عمل کوي. د دې شربت شتون مچي تحريکوي چې په دې موسم کې بچي وروزي. کارګري مچي برمنځي جوړوي او ملکه هګۍ اچوي.
1	2	رقیق شربت: که څه هم دا ډول شربت ډير نه کارول کېږي يا رواج نه لري. ځينې مچي روزونکي د بچيانو د روزنې په موخه، په پسرلي يا د دوبي په پيل کې د شربت پواسطه تغذیه ترسره کوي.



د بورې او اوبو کچه د غلیظ شربت د جوړولو لپاره



د بورې او اوبو کچه د منځني شربت د جوړولو لپاره



د بورې او اوبو کچه د رقيق شربت د جوړولو لپاره

لومړۍ تگلاره: د شاتو د مچيو صندوق خلاص کړئ او وگورئ چې په ريښتيا سره د بچيو ږمنځ خالي دي يا ږمنځي له شاتو ډکي دي. په عمومي ډول دا عمل د پسرلي او مني په موسم کې پېښېږي، د بورې شربت په مستقيم ډول د حجرو دننه (د چوکاټ په خونو کې) تويې کړئ چې کولی شو دا کار د لوبښي يا د اوبه شيندونکي پواسطه ترسره کړو.

دوهمه تگلاره: موم لرونکي چوکاټونه واينځئ او د مچيو د صندوق خوا ته کښيږدئ، شربت د ږمنځو په حجرو کې واچوئ. تاسې ته يادونه کېږي چې دا کار په تودو ورځو کې د سهار لخوا ترسره کړئ. د شربت اندازه د کارگرو مچيو په فعاليت پورې تړاو لري چې څومره کندو ته ورلی شي.



د مچيو د خوړو لوبښي

درېمه تگلاره: شربت د خوړو په يو ځانگړي لوبښي کې واچوئ چې د يو چوکاټ په څير ډيزاين شوی دی. د خوړو لوبښي په صندوقونو کې د تشو چوکاټونو پر ځای کښيږدئ او په همدې لوبښي کې څو دانې نري او اوږده لږگي کښيږدئ ترڅو مچۍ د شربت د اخيستلو په مهال په شربت کې ډوبې نشي.

څلورمه تگلاره: په لويو فارمونو کې چمتو شوی شربت په يو بېرل کې اچوي چې سر يې خلاص وي او بيا څو دانې واړه لږگي چې پاک وي پکې ږدي څو مچۍ په آسانۍ سره شربت واخلي او ډوبې نشي او په پای کې بېرل د مچيو د فارم په منځ کې کښيښودل کېږي ترڅو ټولې مچۍ ورڅخه کارواخلي.

له شکرې څخه د نباتو جوړول: لومړی يوه پيمانې بورې او يوه پيمانې اوبو ته تودوخه ورکړي څو بوره ښه حل شي، بيا بله پيمانې بوره ورواچوئ و بيا بله ور اضافه کوو ترڅو محلول ښه ټينگ شي وروسته محلول له اور څخه را ښکته کړئ، چمتو شوی محلول د کاغذ يا قاب پر مخ واچوئ چې سوړ شي وروسته يې د شاتو د مچيو صندوق ته وليږدوئ او د چوکاټ پر سر يې کښيږدئ. د شکرې د نبات پواسطه د تغذيي په مهال پام وساتئ چې مچۍ اوبو ته کافي لاسری لري. ددې خوړو پواسطه هغه مهال مچۍ تغذيه کوو چې هوا سره وي او خواړه لږ وي، ځکه چې نه غواړو د سړو په موسم کې څو ځلې د شاتو د مچيو صندوق خلاص کړو.

د شاتو د مچيو د کالونيو ليردول

د شاتو د مچيو د صندوقونو د ليردلو لپاره ډير دليلونه شته لکه: د ونو او نباتاتو د گردې شيندنې ، د زياتو شاتو تر لاسه کولو



د شاتو مچيو د کالونيو ليردول يو نوي سيمي ته د موټر په واسطه

او د ناسمي هوا څخه د مچيو ژغورلو لپاره. دا ليرد د لنډ واټن لکه د باغ يو سر بل سر يا حويلې کي يوې خوا بلې خوا ته په لنډه فاصله کي او يا د شاتو د مچيو د صندوقونو ليردول له يوې سيمي څخه بلې سيمي ته په اوږد واټن کي تر سره کيږي.

د شاتو د مچيو ليردول ليري ځای ته: ليري سيمي ته د شاتو د مچيو د صندوقونو له ليرد څخه مخکي بايد لاندې ټکي په پام کي ونيسي:

- د نوي ځای ارزونه د گل او دايمي اوبو د شتون له امله
- مچي روزونکي بايد د شاتو د مچيو د ليرد په مهال له محافظتي جامو څخه کار واخلې
- ځان ډاډه کړئ چي د مچيو د کورنۍ هيڅ غړی له صندوقه بهر يا د دروازي په خولي کي ندي پاتي او د ماښام په مهال دروازه د جالۍ پواسطه بنده کړئ.
- د صندوقونو د ليردولو په مهال له دروازي پرته د صندوقونو ټول سوري بند کړئ چي د ليرد په مهال مچي بهر نشي. دروازه د تهويي لپاره په جالۍ بنديږي.
- ټول صندوقونه بايد ۱۰ چوکاټونه ولري. که په صندوق کي چوکاټونه پوره نه وي، په خالي چوکاټونو يي ځای ډک کړئ او د چوکاټونو څنډي د ميخ پواسطه کلک کړئ ترڅو د ليرد په مهال د هغو له بنوريدو څخه مخنيوی وشي.
- سپارښتنه کيږي چي بايد مخکي د موټر له بارولو موټر روښانه وي ترڅو مچي د موټر له غږ سره آشنايي ومومي او د صندوقونو د ايښودلو په مهال بايد د صندوقونو دروازي د موټر د حرکت په لور وي.
- که په سيمه کي گلان ډير او دايمي اوبه شتون ولري، له پخوانۍ سيمي څخه د شاتو د مچيو ليردول د ۳ کيلو مترو په اندازه بسنه کوي او که په سيمه کي گلان لږ وي، صندوقونه د ۵ کيلو مترو په اندازه ليري وليږدولي شي. که له دې څخه په لږ واټن مچي وليږدول شي يو شمير کارگري مچي پخوانۍ سيمي ته ځي. نو ويلی شو چي د ليرد واټن د گلانو او اوبو له شتون سره مستقيمي اړيکي لري.
- د ليرد عمل دې بايد له لمر پريوتو وروسته يا د لمر له ختلو مخکي چي ټولي مچي په صندوق کي وي، ترسره شي.
- له ليردولو مخکي په هرې کالونۍ کي د لوگي د پمپ کارول د شاتو مچي آراموي او له الوتلو او چيچلو څخه مخنيوی کوي.
- د مچيو د ليرد پروسه بايد داسي پلان شي چي د لمر له راختمو څخه د مخه نوې سيمي ته ورسېږي. ښه ډاډه چي د لمر له پريوتو څخه وروسته وليږدول شي ځکه چي په دې مهال کي مچي ډيري فعالې نه وي.
- له رسيدو څخه ۲۰ — ۳۰ د دقيقو پوري د صندوقونو دروازه مه خلاصوئ ترڅو مچي يو څه آرامي شي.
- کله چي د مچيو صندوق په نوې سيمه کي ږدئ، صندوقونه بايد پر پايو يا کانو کښيږدئ څو د ځمکي له لنډېل څخه په امان کي وي ځکه چي لنډېل د شاتو د مچيو يو ستر دوښمن دی.

د شاتومچيو د کالونیو لیردول نږدې واټن ته: که مو پریکړه کړې وي چې خپلې مچۍ نږدې واټن لکه د حویلی / باغ یو سر بل سر ته ولیردوئ، په لاندې ډول عمل وکړئ:

لومړۍ تگلاره: د شاتو د مچيو صندوقونو ځای ته په یوه شپه او ورځ کې د یو متر په کچه بدلون ورکړئ. په دې ډول مچۍ ورو، ورو له نوي ځای سره بلدیږي او کولی شي د خپل صندوق د ننوتو دروازه ومومي او ددې کار په تکرار سره کولی شو د مچيو کالونی د خوښې وړ ځای ته ولیردو.

دوهمه تگلار: ددې تگلارې د عملي کولو لپاره لاندې ټکو ته باید پام وکړو:

- د لمر له ختلو مخکې یا له لمر پریوتو وروسته کله چې ټولې مچۍ په صندوق کې وي، د ننوتو دروازه په جالۍ بنده کړئ چې تازه هوا داخله شي او مچۍ وتلی نشي.
- وروسته له دې مو چې د صندوق د ننوتو دروازې بندې کړې، صندوقونه یوې تیاري او سړې خونې ته ولیردوئ
- چې کله مچۍ درې ورځې په تیاره او سړې خونې کې تیرې کړې، صندوقونه خپل نوي ځای ته ولیردوئ او د ننوتلو دروازه یې خلاصه کړئ. له درې ورځو وروسته مچۍ خپل د ځای موندنې GPS سیستم بیا ځلي عیاروي او له همدې ځایه خپل فعالیت پیلوي. دا تگلاره ډیره اقتصادي نده، ځکه مچۍ د نکټار او گردې له ټولولو څخه بېرته پاتې کیږي مګر بله چاره نشته.
- ددې مودې له بشپړیدو سره موږ کولی شو مچۍ هر ځای ته چې وغواړو، ولیردو. له دې کړنې سره مچۍ د درې ورځو په موده کې له پخوانۍ سیمې سره بلدتیا هیروي او له نوي سیمې سره آشنا کیږي.

دریمه تگلاره: موږ کولی شو صندوقونه د ۳ کیلو مترو په واټن ولیردو او په نوي سیمې کې ۳ اونۍ پاتې شو او له ۳ اونۍ وروسته کولی شو نوي ځای ته یې ولیردو.

د نوي ډلې یا د نوي کالونی تشکیلیدل

د گل کول به موسم یا د پسرلي په مهال کله چې د مچيو کالونی پراختیا مومي او په صندوق کې په کافي اندازه ځای نه پاتې کیږي، کارګري مچۍ د ملکې په شتون کې نوي ملکه روزي، دا ددې لامل کیږي چې د شاتو د مچيو کالونی په دوو ګروپونو وویشل شي، هر ګروپ یوه ملکه. دا د مچيو بیله شوی ډله له ملکې سره د نوي کالونی په نامه یادېږي. په عمومي ډول په دوو لارو سره د شاتو په مچيو کې تکثیر (د ډلې یا نوي کالونی جوړیدل) ترسره کیږي چې یو یې طبعي او بل یې مصنوعي دی. موږ غواړو د هر یوه په اړه جلا، جلا بحث وکړو چې په لاندې ډول دی.



د مچيو د کالونی د غرو شمیر زیات شوی او تکثیر ته چمتو دی



په طبعي ډول په کالونی کې د گروپ جوړیدل: د پسرلي په موسم کې قوي صندوقونه نوې ډلې جوړوي. په دې فصل کې معمولاً ملکه د چوکاتونو په حجره کې هڅې اچوي تر څو ټولې حجرې له هڅې، نوې لارو او زړه لارو څخه ډکې شي او په دې مهال کې د شاتو د مچيو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او په صندوق کې خالي ځای نه پاتې کېږي، په همدې وخت کې کارگرې مچۍ د ملکې لپاره حجره جوړوي او کله چې نوې ملکه وزیږېده، مشره ملکه د کالونی له ۵۰٪ نفوس سره له صندوقه وځي. یا دا چې د ملکې له وتلو ۱۲ ورځې وروسته نوې ملکه پیدا کېږي چې د مچيو د روزونکو لپاره دا ډیر مهم دی چې د ملکې یا د نوې ډلې د تولید پر پروسې وپوهیږي.

په مصنوعي ډول د نوې ډلې تشکیلول: په مصنوعي ډول د یوې ډلې د تشکیل لپاره مور دوه ساده تخنیکونه کارولی شو چې په لاندې ډول دي:

لومړۍ تگلاره: د پسرلي په موسم کې یو صندوق چې ۱۰ چوکاټه مچۍ لري ټاکو او دا صندوق د مورنۍ صندوق په نامه یادوو او هغه صندوق چې هغه ته چوکاټونه لېږدوو، د لور د صندوق په نامه یادېږي.

- صندوق تش کړئ او ټول چوکاټونه ورڅخه بهر وباسئ
- ټول چوکاټونه په موم وپوښئ او د لوګي له پمپ څخه کار واخلئ
- یو چوکاټ چې له ځوانو کارگرو مچيو ډک وي او پېوپا ولري را واخلئ او د لور په صندوق کې یې کېښودئ. دوهم چوکاټ هم په همدې ډول ولېږدوئ.
- له مورنۍ صندوق څخه یو بل چوکاټ وټاکئ چې کارگرې مچۍ، گرده او نکتار ولري او د لور په صندوق کې کېښودئ.
- په پای کې یو چوکاټ چې له مچيو څخه ډک وي را اخلو او د لور په صندوق کې یې ځنډو او تش چوکاټ بیرته مورنۍ صندوق کې ږدو.
- د ۳ ورځو په موده کې د لور صندوق یوه نویې ملکه تولیدوي او مور باید د اړتیا سره سم د لور په صندوق کې نور چوکاټونه کېښودو.

نوب: په یاد مو وي چې د عملیاتو په بهیر کې باید تل ملکه مورنۍ صندوق کې پاتې شي، د چوکاتونو خالي ځایونه باید په نویو چوکاتونو سره چې موم ولري، ډک کړو او د بورې شربت ورکړو. امکان د ولري د دریو ورځو په بهیر کې د لور صندوق نوی ملکه تولید کړي او د چوکاتونو زیاتول د مچيو د شمیر مطابق باید تر سره شي.

دوهمه تگلاره:

اړین وسایل:

1. دري نسبتاً ځواکمنې کورنۍ
2. دوه تش صندوقونه
3. یو شمیر موم لرونکي چوکاټونه
4. د لوګي پمپ او لوګي تولیدونکي توکي
5. گلاب (د گلابو اوبه)

موږ درې مورني صندوقونه ټاکو او دوه تش صندوقونه ورته نږدې کوو، له هر صندوق څخه يو چوکاټ له ځوانو مچيو او خلاصو شفيرو سره را اخلو او په دوو تشو صندوقونو کې يې ږدو. له دې کار څخه مخکې په درې واړه مورنيو صندوقونو کې گلاب شيندو چې ټول يو بوی واخلې او يو بل ونه وژني. بيا د مورنيو صندوقونو له جملې له دوو څخه چې ډير قوي وي يو، يو چوکاټ چې ترلې شفيرو ولري، را اخلو د لورگانو په صندوقونو کې ږدو او د دريم ځل لپاره يو، يو چوکاټ چې شات او گرده ولري را اخلو او په نوي صندوقونو کې يې ږدو. په حقيقت کې مو له درې مورني صندوقونو څخه دوه نوي صندوقونه اخيستل شوي دي چې د ۱۰ – ۲۰ په موده کې به په دې دوو صندوقونو کې نوې ملکه توليد شي. پرته لدې چې مورني کورنۍ مو زياتې کمزورې کړې وي. د اخيستل شوو چوکاټونو ځای به د نويو موم لرونکو چوکاټونو پواسطه ډک کړو او ددې کړنو به مهال ملکه له مورني صندوق څخه د لور صندوق ته و نه ليردول شي.

د شاتو د مچيو د کالونيو يو ځای کول

ز د افغانستان ژمی سوړ وي. ددې موسم له راتلو سره بايد د شاتو د مچيو ځواکمن صندوقونه ولرو او ډاډه و اوسو چې تر بېرلي پورې ژوندۍ پاتې کېږي. ځکه چې ځواکمني مچۍ د کمزورو مچيو په پرتله د سړو سره زيات مقاومت لري. موږ بايد ضعيف صندوقو يو له بل سره او يا له قوي صندوقونو سره يو ځای کړو. د شاتو د مچيو کمزورې کورنۍ لږې مچۍ لري، يعنې درې چوکاټه مچۍ لري. يا هغه صندوقونه چې د مني په موسم کې ملکه نه لري، په کمزورو صندوقونو کې



د دوو کالونيو يو ځای کول په يو صندوق کې د CARD-F له درسي موادو څخه

شمارل کېږي او يوځای کولو ته اړتيا لري. مگر قوي صندوقونه ۶ چوکاټه مچۍ لري. د شاتو د مچيو د صندوقونو يوځای کول په دې مانا ندی چې د شاتو مچۍ له يو صندوق څخه بل ته ور واچوو، دا کار په ريښتيا سره مچيو ته تاوان ور اړوي. د مچيو د صندوقونو يو ځای کولو وخت او احتياط ته اړتيا لري. دا کار بايد په ډير مهارت سره ترسره شي او د بورې پواسطه تغذيه شي تر څو کار په سم ډول پر مخ ولاړ شي. د شاتو د مچيو د صندوقونو د يوځای کولو ترټولو ښه وخت د دوبي پای او د مني پيل دی او د دوو صندوقونو د يوځای کولو لپاره بايد لاندې ټکي په پام کې ونیول شي:

- کمزورې کالونۍ مالومي کړئ د لوگي له پمپ څخه کار واخلئ او صندوق خلاص کړئ
- د کمزورې صندوق څخه کیفیت لرونکي چوکاټونه چې هگۍ، نوي زيږيدلي، پيوپا او شات ولري، وټاکئ
- د لوگي له پمپ څخه کار واخلئ او د مچيو قوي صندوق خلاص کړئ
- د دواړو صندوقونو ملکي سره پرتله کړئ او زړه ملکه له منځه یوسئ
- د گلابو شيره په دواړو صندوقونو کې وشيندئ
- د دوو کالونيو يو ځای کول د منزل يا سوپر په ښه، د ملکي د صندوق سر پوښ او د هغه صندوق لاندینی فرش ليري کړئ چې ملکه نلري. د هغه صندوق پر سر يو اخبار واچوئ چې ملکه لري، اخبار د ميخ پواسطه سوري، سوري کړئ چې دواړه صندوقونه يو بوی واخلې. هغه صندوق چې ملکه نه لري، د ملکي لرونکي صندوق پر سر ږدو او

سرپوش ورباندې ږدو لکه چې په انځور کې يې گورئ

- د دوو کالونیو یو ځای کول په یو صندوق کې، په پیل کې ټول خالي چوکاټونه له صندوقه باسو او پاتې يې په د صندوق په یو ه خوا کې داسې تنظیم کړئ چې د منځ چوکاټ يې د ننوتو دروازې سره اړیکه ولري او پر هغو اخبار اچوو، اخبار د میخ پواسطه سوري، سوري کوو. بیا د هغه صندوق څخه چې ملکه نه لري، د ښه کیفیت لرونکي چوکاټونه له مچيو سره (پرته له ملکې) را اخلو او د مچيو په قوي صندوق کې يې ږدو لکه په انځور کې چې لیدل کيږي. دا کړنې د مني په موسم کې ترسره کيږي ځکه چې کمزوري کورنۍ په برياليتوب سره ژمی نشي تیرولی، کیدای شي ټولې مچۍ د سړو له امله مړې شي.

د شاتو د مچيو د صندوق پر سر د صندوق ایښودل

پاسنی صندوق یو بکس دی چې په چوکاټونو کې يې شات ذخیره کيږي. د مچيو روزنکو ته مهمه ده پوه شي چې څه وخت



باید د لا زیاتو شاتو د ذخیره کولو لپاره پاسنی صندوق د مچيو پر صندوق کښيږدي. ددې کار لپاره د پسرلي فصل ډیر وړ دی. ځکه چې یوه کالوني ۵-۶ چوکاټه نوي بچي تولیدوي. د پاسني صندوق له ایښودلو څخه مخکې باید ډاډمن شئ چې دا صندوق له ناروغیو، آفاتو او ارګانیکو موادو څخه پاک دی. د بچيو د صندوق سرپوش لیرې کړئ او پاسنی صندوق ورباندې کښيږدئ او په لاندې لارښوونو عمل وکړئ:

- 1- د ملکې منع کوونکي تخته د څو ورځو لپاره نصب کړئ ترڅو ملکه د هغې اچولو لپاره پاسني صندوق ته ولاړه نشي. او کارگري مچۍ هلته په خپل کار پیل وکړي. کله چې مچيو د ږمنځو په جوړولو پیل وکړ، د ملکې د تیریدو منع کوونکي دره ولگول او ډاډه شئ چې ملکه د بچیانو په صندوق کې پاتې کيږي



- 2- که د بچيو د صندوق چوکاټونه پوره نه وي، د څیرني په مهال يې حالت گورو، که اړینه وي هغو باندې نور چوکاټونه اضافه کړئ او که نه نو ۵-۶ چوکاټونه هم بسنه کوي.

- 3- یو څه د بورې شربت د پاسني صندوق پر چوکاټونو وشیندئ تر څو مچۍ پاسني صندوق ته د تللو لپاره تشویق او هلته په کار پیل وکړي.

- 4- کالونی په رقیق شربت سره تغذیه کړئ. که په کافي کچه خواره شتون ونلري، د شاتو مچۍ به موم تولید نکړي. مور نه غواړو پاسنی ږمنځي یا چوکاټونه ټول له بورې څخه ډک شي، مگر یوه لږه شکره هغو ته دا ځواک ورکوي چې په کار پیل وکړي.

- 5- کله چې پاسنی چوکاټونه له شاتو څخه ډک شول، سمدلاسه هغه وباسئ. پاسنی صندوق لیرې او د بچيو د صندوق سرپوش بند کړئ.

ژمني چمتو والی

افغانستان یو اوږد او سخت ژمی لري: اړینه ده چې د هغه لپاره چمتوالی ولرو تر څو د مچيو د ژوندي پاتې کیدو څخه ډاډه شئ او دا موسم به بریالیتوب سره تیر شي. په لاندې ډول د ژمني چمتوالي لپاره لاندې سپارښتنو ته مو پام اړوو:



د صندوق په داخل کې د ذخیره شوو شاتو کتل

1. کندو د شاتو د ذخیرې کتل: که مو صندوقونه ډیر سپک وي، مصنوعي خواړه دي باید ورکړل شي. مچيو ته باید د هوا له سریدو څخه مخکې خواړه ورکړل شي لدې پرته به مچي د خوړو د ذخیره کولو لپاره کافي وخت و نلري. که د مچيو تغذیه به وخته ترسره شي، د شربت هګر په بڼه ډول د کارګري مچي لخوا نشي تر سره کیدای او شربت به خوسا شي. نوځکه د مچيو تغذیه باید د مني په پیل کې ترسره شي

2. مخکې له دې چې ژمی راشي، د شاتو د مچيو د صندوقونو داخل پاک کړئ. که د مچيو شمیر زیات نه وي، پاسني صندوق لیرې کړئ او چوکاټونه د پاتې صندوق د ننه تنظیم کړئ.



د مچيو د صندوقونو پاکول



د پاسني صندوق لیرې کول او د چوکاټونو تنظیم کول

3. د شاتو د مچيو د صندوق خالي ځایونه د یو نخي توکر پواسطه ډک کړئ چې لندبل جذب او مچيو ته تاوان ونه رسوي.

4. د شاتو د مچيو د صندوق د ننوتلو لپاره کوچنی کړئ او د تاوده ځای څخه سور ځای ته د صندوق له لیریدولو ډډه وکړئ.

5. د مچيو لپاره د ژمي د تیږولو ځای ډیر مهم دی: د صندوق د ننوتلو دروازه باید د باد د لګیدو په مخالف خوا کې وي. د شاتو مچي له سړې هوا سره مقابله کولی شي، مګر د باد په وړاندې مقابله نشي کولی. د شاتو د مچيو صندوقونه باید په ژمي کې له باد، باران او لندبل څخه وساتئ.



په ژمي کې يو ډول تياري- د انځور سرچينه د CARD-F درسي مواد



د مچيو کالوني د ژمي د تيروولو لپاره په يو مناسب ځای کې ايښودل

6. لندبل د شاتو د مچيو د کالونيو لپاره يوه جدي ستونزه شميرل کيږي. په صندوق کې د لندبل د مخنيوي لپاره په ځالي ځايونو کې توکر کښيښودل شي او د تهويي سيستم برابر وي. (هوا بايد له لاندې خوا ننوځي او د صندوق له پاسني برخې ووځي).

7. که تاسې اړتيا لرئ چې په ژمي کې خپلې مچۍ تغذيه کړئ، دا کار په نارمل ورځو کې چې د تودوځي درجه ۱۰ - ۱۲ سانتي گراد وي ترسره کړئ. د صندوق سر لږ خلاص او په چټکۍ سره مچيو ته خواړه ورکړئ. ښه به وي هرڅومره چې کيدای شي دا کار په تيزۍ سره ترسره شي.



په ژمي کې د صندوق د سرپوښ لري کول د تغذيي لپاره



په چوکاټ کې د بورې د شربت اچول د مچيو د تغذيي لپاره

د مچۍ روزنې تجهيزات او د هغوي د کارولو موارد

تجهيزات د مچيو روزلو يوه مهمه برخه تشکيلوي. ټول سامانونه بايد اقتصادي او په سيمه ايز ډول شتون ولري او د اوږدې مود د کارولو وړتيا ولري. په لاندې ډول د مچۍ روزنې د ځينې سامانونو په هکله لنډ مالومات ورکړل شوي دي:

د شاتو د مچيو صندوق:



په افغانستان کې عموماً د مچيو روزونکي له لس چوکاټه صندوقونو څخه کار اخلي چې چوکاټونه يې د را ايستلو وړ دي. دا ډول صندوقونه دوه برخې لري چې يوه برخه يې د مچيو د روزنې لپاره ده چې د مچيو پور په نوم ياديږي او بله برخه يې د شاتو د توليد پور دی چې د پاسني کوچني صندوق په نامه ياديږي. ددې صندوقونو لوړوالي د صندوق له پلنوالي څخه لږ دی. په دې صندوقونو کې د چوکاټونو ترمنځ واټن په پام کې نيول شوی دی. پر ځمکه د اېښودو په مهال بايد پر ۵ سانتي متره پايو کښيښودل شي.

د ملکي منع کونکي دره:



د مچيو روزونکي د ملکي د منع کولو دره د مورنۍ صندوق او سوپر يا پاسني صندوق ترمنځ کاروي ترڅو پاسني پور ته د ملکي له تللو او هڅې اچولو مخنيوی وکړي. گټه يې دا ده چې کارگري مچۍ وکولی شي د پاسني پور په رمنځو کې د پاکو او خالصو شاتو توليد ته دوام ورکړي. ددې درې سوري د کارگرو مچيو د تيريدو لپاره کافي او د ملکي د تيريدو لپاره په کافي کچه کوچني دي. ددې درې سطحه او د تيريدو سوري داسې ډيزاين شوي چې کارگرو مچيو ته د تيريدو په مهال تاوان نه اړوي او په آسانۍ ورڅخه تيریږي.

د لوگي پمپ:



د لوگي پمپ له هغو سامانونو څخه دی چې کارول يې مچۍ ليري کوي. په دې مهال کې مچۍ صندوق ته ننوځي او ځان له شاتو څخه مړوي. دا کار ددې لامل کيږي چې مچۍ لږ دفاعي حالت ونيسي. که غواړئ چې يو يا څو صندوقونه وڅيرئ، او له مچيو سره کار وکړئ، سپارښتنه کيږي چې د لوگي له پمپ څخه کار واخلئ. کولی شو خوشايي او ځيني تېبانات د لوگي د توليد د توکو په څير وکاروو.

د شاتو ايستلو ماشين:



ډيری مچيو روزونکي د شاتو د ايستلو له فولادي ماشينونو څخه کار اخلي چې په مختلف اندازو کې شتون لري. په افغانستان کې له څلور چوکاټه ماشينونو څخه کار اخيستل کيږي، مگر دا د مچيو د روزنې د فارم د کالونيو په شمير پورې تړاو لري. دا ډول ماشينونه په يو وخت کې له ۲ يا له دې نه د زياتو چوکاټونو څخه د شاتو ايستنه کولی شي.

محافظتي جامي:



له مچيو سره د کار کولو په مهال اړينه ده چې له محافظتي جامو څخه کار واخلو. په ټوله کي کله چې د شاتو له مچيو سره کار وکړو، د خولي، اوږده دستکشو کارول اړين دي. د شاتو مچي په مختلفو حالتو کې له ځانه مختلف غبرگونونه ښيي، دا جامي تاسي ددوي له چيچلو څخه ساتي. کله چې له مچيو سره کار کوئ، ډير ورو او په احتياط سره کار وکړئ او مچيو ته ستونزي مه جوړوئ. تل روښانه رنگ جامي اغوندئ ځکه چې مچي له روښانه جامو څخه ليري ځي او دا د مچيو عادت دی چې په تورو جامو باندې حمله کوي. تل مو دستکشونه پاک واینځئ ځکه ناروغی د ناپاکو دستکشونو پواسطه په آسانی سره له يوې کالوني څخه بلې ته ليرديږي.

د مچيو د روزني موسمي کړنې

دا مهمه نده چې موږ د مچي روزني له څه ډول صندوقونو او کومو تجهيزاتو څخه کار اخلو، مگر د مچيو د صندوقونو وضعیت زموږ لپاره مهم دی. که د شاتو مچيو ژمی په ښه ډول تیر کړی وي، د شاتو توليد به يې زیات وي او په هيڅ ناروغی به اخته او د خوړو له کمښت سره به مخامخ نشي. دا په دې مانا دی چې د مچيو روزونکي په مختلفو شرايطو او موسمونو کي تل له خپلو مچيو څخه ښه ساتنه کوي.

د پسرلي موسم:

الف: د پسرلي د موسم (د ونو له گل کولو څخه ۱۵ ورځې مخکې) په تودو ورځو کې د شاتو مچي د بورې په شربت سره تغذیه کړئ ترڅو ملکه د هگي اچولو لپاره چمتو شي. کارگرې مچي د گردې، نکتار راټولولو او د بچيو روزني ته تحریک شي او د صندوق د تودوخې د کنترول لپاره اوبه راوړي.

ب: خراب چوکاټونه له صندوق څخه ليري کړئ او نوي موم لرونکي چوکاټونه يې پر ځای کښيږدئ، همدارنګه مخکي کارول شوي چوکاټونه بايد د اور پواسطه ضد عفوني شي. صندوقونه او چوکاټونه بايد پاک او وچ وساتل شي.



د اور پواسطه د چوکاټونو ضد عفوني کول او د صندوقونو پاکول



د دهغو چوکاټونو ليري کول چې موم يې خراب شوی وي

ج: د پسرلي په پای کې د شاتو د مچيو شمير زياتيږي او د ځوانو مچيو شمير هم په صندوق کې زياتيږي کله چې د شاتو د مچيو شمير زيات شي، کارگري مچي هم زياتيږي. کارگري مچي د نکتار او گردې په راټولولو بوختيږي چې ورته ډيره اړتيا ده. په همدې دليل نورو موم لرونکو چوکاټونو يا پاسني صندوق ته اړتيا پيښيږي چې په تېرو درسونو کې تشرېح شول.

يادونه:

د پسرلي په پيل کې که اړتيا نه وي، هيڅکله د شاتو د مچيو صندوق کې لاسوهنه ونکړئ. د پسرلي په پيل کې تر ډيره بايد هڅه وشي چې د شاتو د مچيو صندوقونه تاوده وساتل شي. که د شاتو مچيو د صندوق سر په سره هوا کې خلاص کړو، کيدای شي د مچيو بچي د سري هوا له امله مړه شي. د ملکي او د خورو د شتون لپاره د صندوق کتنه ډيره مهمه ده چې بايد په پام کې ونيول شي ځينې وختونه د مچيو ملکه په ژمي يا د پسرلي په سر کې مري او بچي لا نه وي توليد شوي چې کارگري مچي ملکه توليد کړي، په دې مهال کې د مچيو کورني پتيمه پاتي کيږي (بي ملکي کيږي) دا ډول کورني ستري او غير فعاله وي او نشي کولی کرده او نکتار راټول کړي. که د مچيو صندوق خلاص شي او په هغه کې ملکه نه وي، د مچيو شمير به کم وي دا ډول کالوني بايد له نورو کالونيو سره يوځای شي يا هم له بلې قوي کالوني څخه دوه چوکاټه چې هگي، لاروا او پوپا ولري راواخيستل شي او په پتيمه کالوني کې کينښودل شي. په دې وخت کې به کارگري مچي له بچيو څخه يوه ځوانه ملکه وروزي.

د دوبي فصل:



د منځ چوکاټونه له شاتو ډک شوي د يوې اونۍ په ترڅ کې د شاتو ايستلو لپاره چمتو کيږي

د پسرلي په پای او د دوبي په پيل کې اړين دي چې د ځواکمنو کالونيو لپاره پاسني پور اضافه شي ځکه مچي د داخلي دندو د سرته رسولو لپاره يوې لويې فضا ته اړتيا لري، په دې مهال به بهرني کارونه کم کړای شي، د څو ورځو په ترڅ کې به يوه نوې ملکه توليد او نوې ډله به بېليدو ته چمتو شي. بڼه دا ده چې صندوقونه وکتل شي، د څيړني په مهال که ۵ چوکاټونه له شاتو ډک شوي وي، بايد ټولو ډک شويو چوکاټونو شات وايستل شي او بڼه به داوي چې د مچيو کالوني يوې داسې سيمي ته چې ډير گلان او د اوبو سرچيني ولري، وليږدول شي. لکه څرنگه چې د دوبي په مهال هوا توديږي، کالوني دې سپوري ته وليږدول شي تر څو مچي ډيرو گلانو ته ورشي او په پايله کې د شاتو توليد زياتيږي.

د مني موسم:

د مني د موسم مديريت د مچيو په روزنه کې مهم رول لري. په حقيقت کې د مني د موسم مديريت د سرو لپاره چمتووالی دی. موږ بايد د شاتو مچيو صندوقونه د شاتو او د ملکي د شتون لپاره چک کړو دا ددې موسم له فعاليتونو څخه شميرل کيږي چې د ژمني موسم په برخه کې پخوا تشرېح شول.

د مچيو د روزني له ستونزو او ناروغيو سره مجادله

د شاتو د مچيو ساتنه د وحشي مچيو له حملې څخه: ځواکمني کالوني کولی شي د وحشي مچيو او کنو په وړاندې له خپل ځانه ساتنه وکړي، مگر کمزوري کالوني په آساني سره د خورو او شاتو د راټولولو په مهال د وحشي مچيو تر حملې لاندې راتلی شي. ژيري وحشي مچي کولی شي ستاسې د مچيو کالوني له منځه يوسي او ټول هغه شيان لکه هگي، لاروا او د شاتو ذخيره وخوري او تر هغو په صندوق کې پاتي کيږي چې صندوق خالي شي. نو ځکه بايد لاندې اړين اقدامات ترسره کړو:

1. د صندوقونو د ننوتلو لاره بايد د مچيو د فعاليتونو سره سم کوچنۍ کړای شي. دا کار د صندوق له ساتونکو سره مرسته کوي چې په آساني سره صندوق ته د وحشي مچيو د ننوتلو مخنيوی وکړي. د مني د موسم په پای کې په صندوق کې د ننوتلو لويو ليارو ته اړتيا نشته، بڼه دا ده چې د ننوتلو دروازه د يوې مچي د ننوتلو په اندازه کوچنۍ کړو او صندوق ته د نورو ليارو له نشتون څخه ډاډه شو تر څو وحشي مچي صندوق ته د ننه نشي.

2. په سیمه که د وحشي مچيو خالي ومومي. ډيري وحشي مچي خپلي خالي د اوبو ذخيره ته نږدې، د کانو په مخونو، په ځمکه او د ډيوالونو په چاودونو کې جوړوي. مور کولی شو هغه د ورځي په مهال ومومو او د شپې په مهال يې له منځه يوسو ځکه چې د شپې له مخې ټولي وحشي مچي په خپله خاله کې وي.

3. د وحشي مچيو سره د مقابلې يوه سمه لياره د پلاستيکي تلکونو کارول دي. مور کولی شو دا تلک پر ډيوال يا ونو باندې وڅړوو مگر د شاتو د مچيو صندوقونو ته نږدې نه وي. دا تلکونه د وحشي مچيو پام ځان ته اړوي نه د شاتو د مچيو. په دې تلکونو کې د پسرلي په مهال له خامې غوښې او د مني په موسم کې د بورې له شربت يا شاتو څخه کار واخلئ. غوښه او بوره د وحشي مچيو پام ځانته اړوي او د تلک له سوري څخه په آسانۍ سره تلک ته ننوځي او بيرته د وتلو لياره نشي موندلې چې بيا له منځه ځي. د تلک د جوړولو پروسه ډيره آسانه ده چې په انځورونو کې ليدل کيږي.



د پلاستيکي تلک د جوړولو لومړي او دويمه مرحله



يو ساده پلاستيکي تلک او په دام کې لويديلي وحشي مچي

د پلاستيکي تلک د جوړولو دريمه مرحله

د وړو کنه: د وړو کنې د شاتو د مچيو خارجي پارازيتونه دي چې په نرۍ کې د شاتو مچي په تيره بيا ابيس سرينا او ابيس ملفيرا باندې يرغل کوي. نوموړي ناروغي چه د کنو په واسطه منځ ته راځي وروښ نوميري، دا کنه د بالغو، پيوپا او شفيري له هيمو لمف (د بدن مايعات) څخه تغذيه کوي او د شاتو مچيو لپاره له خطر ډکې دي. که په پيل کې يې درملنه ونشي، د مچيو کالوني د ۱ څخه تر ۲ کلونو په موده کې له منځه وړي. دا کنې د مچيو د وينې په خوړلو سره کالوني کمزوري کوي چې په پايله کې د مچيو روزونکو ته مالي تاوان وراړوي. ددې کنې د ژوند دوران هم د شاتو د مچيو پشان دی.



د وروا کنه د بالغې مچۍ او شفیرې د وینې زبېښلو په مهال

د ناروغۍ لیریدل: لکه څنگه چې مخکې ذکر شو، د شاتو د مچيو اخته کورنۍ د کني پواسطه کمزورې کيږي. دا کمزورې کورنۍ د ځواکمنو او روغو کورنيو پواسطه چور کيږي او له دې سره د کني ناروغي روغو کورنيو ته هم لاره مومي.

د ناروغۍ درملنه: دا بهتره ده چې له درملنې مخکې په کالونۍ کې د کنو شمیر مالوم کړای شي. ځکه نو لازمه ده چې مچۍ روزونکي د پسرلي په موسم کې په دوامداره توګه د خپلو مچيو صندوقونه تر څارنې لاندې ونيسي، که په مرض د اخته مچيو شمیر کم وي، درملنې ته اړتیا نشته او که ډیرې مچۍ په مرض اخته شوي وي، نو باید سمدلاسه یې درملنه وشي. که د مني په موسم کې کني په صندوق کې شتون ولري، باید درملنه ترسره شي، درملنه باید په منظمه بڼه ترسره شي څو ډاډه شو چې ناروغي ټوله له منځه تللي ده. د کنو د شمیر د مالومولو او اړینو اقداماتو لپاره یوه ساده ازموینه تاسې ته درېږنو چې لاندې شیان ورته اړین دي:



1. د بورې پوډر
2. یو فلاسک د ۱.۵ لیتر په ظرفیت یا داسې پلاستیک چې ۶۰۰ دانې مچۍ پکې ځای شي
3. یونسبتاً لوی پلاستيکي بوتل یا قوطی د بنورولو لپاره
4. یو غلبلل یا وړوکی صافي
5. یوه ټوټه سپین ټوکر یا کاغذ
6. یو کوچنی سطل
7. یو وړوکی بوتل د ۷۰ ګرامو په ظرفیت سره

د ازمايښت تگلاره:

1. په پیل کې د شاتو د مچيو چوکاټ وټاکئ او ټولې مچۍ يې پر تختې واچوئ (د لومړي انځور پشان)
2. ټولې مچۍ له تختې را واخلئ او په کوچني بوتل کې يې واچوئ (د دوهم انځور په څير)
3. مچۍ له فلاسک څخه د ښورولو بوتل کې واچوئ (د دريم انځور په ډول)
4. د ښورولو د بوتل سر کلک وټړئ (د څلورم انځور پشان)
5. ۷۰ گرامه د بورې پوډر د بوتل پر سر واچوئ (پنځم انځور په څير)
6. د بورې د پوډر تر اچولو وروسته بوتل ښه وښوروئ ۲۰ – ۳۰ ثانيې (د شپږم انځور په ډول)
7. له ښورولو وروسته د بورې پوډر غلبلل کړئ. له غلبلولو سره د بورې پوډر له غلبل څخه تيريري او کني له يوې اندازې پوډر سره په غلبل کې پاتې کيري. بنده پاتې شوی کني د توکر د پاسه اچو او شميرو يې او مچۍ بيرته صندوق ته اچو د اووم، آتم او نهم انځورونو په ډول.



انځور 1



انځور 2



انځور 3



انځور 4



انځور 5



انځور 6



انځور 7



انځور 8



انځور 9

د ناروغي درملنه د کڼو په شمير پورې اړه لري کوم چي د لاندې جدول مطابق صورت نيسي:


د ازمايښت وخت			پايله
غبرگولي	غويي	وري	
۳۰ < کڼه	۲۰ < کڼه	۱۰ < کڼه (د کڼو شمير له لس څخه لږ دی)	په دې وخت کي د وروا کڼي د شاتو مچيو ته خطر نه پېښوي درملني ته اړتيا نه ليدله کيږي .
۳۰ تر ۵۰	۲۰ تر ۵۰	۱۰ تر ۵۰	مچۍ تر تهديد لاندې دي بڼه به داوی تر څو درملنه تر سره شي
۵۰ < کڼه	۵۰ < کڼه	۵۰ < کڼه د کڼو تعداد له ۵۰ څخه زيات دي	د شاتو مچۍ تر جدې تهديد لاندې دي بايد ژر تر ژره درملنه تر سره شي.

د ناروغي درملنه: اوسمهال مچۍ روزونکي د درملني لپاره له فورميک اسيد، ابي وار او ابيستان څخه کار اخلي. د وروا د کڼو درمل له ايران څخه وارديږي. د مچيو روزونکو ته سپارښتنه کيږي چي ددې درملو د کارولو په مهال د کمپنۍ له لوري د چمتو شوي اندازې يا د لارښود پاني سره سم عمل وشي



امريکايي فولبرود: امريکايي فول بروډ د شاتو د مچيو لپاره يوه پراخه، ويجاړونکې او مهمه ناروغي ده. په پيل کي په ناروغي اخته کالوني له ځانه هيڅ نښي نه ښکاره کوي. ښايي څو داني مري لارواو او پيوفاوۍ په صندوق کي وليدلي شي. تر څو چي کالوني ښه کمزوري شوې نه وي، ناروغي به خپلې خطر ناکې بڼې نه ښکاره کيږي. کرار کرار سره کالوني کمزوري کيږي او د دوه کلونو په بهير کي ناروغيه کالوني له منځه وړي.

د ناروغي نښي: دا ناروغي يواځې د ودې په حال کي بچي اخته کوي چي په لومړي پړاو کي يې نښي د اخته حجرې لوندوالۍ او توربخن رنگ دي او د روغو حجرو په پرتله يې سر کښيناستلی مالوميږي او ځيني وختونه واره سوري هم پکي ليدل کيږي، په داسي حال کي چي د روغو حجرو سرونه پرسيدلي ښکاري. همدارنگه به اخته چوکاټ کي د هگۍ اچونه هم په غير منظمه بڼه وي. که د گوگرو يو خلی په حجره کي د ننه کړئ له را ايستلو سره يې يو ډول سرينسناکه ماده د تار په څير په گوگر پورې نښتی وي چي بد بوی کوي او د وخت په تيريدو سره به مړه لاروا وچه، توره او ميديږي چي په حجرې پورې نښتي وي.



په ناروغۍ اخته سر ترلي حجرې



د گوگړو د خلي تجربه

دناروغي لامل: ددې ناروغۍ لامل د سپور په څير له خوړو سره د کارگرې مچۍ پواسطه د ځوانو لاروا گانو بدن ته داخلېږي او د هغو د هاضمې سيستم ته داخلېږي او هلته رشد او تکثر کوي. د غټو لارواگانو په بدن کې وده نشي کولی ځکه چې چاپېريال ورته چندان مناسب نه وي، مگر کله چې لاروا په شفيري بدله شي، چاپېريال ورته چمتو کېږي او په تيزۍ سره په تکثر پيل کوي تر څو شفيره مړه کړي. کله چې کارگره مچۍ حجره پاکوي، او شفيره له حجرې څخه را باسي، د وېروس سپورونه د صندوق دننه خپريږي.

د ناروغۍ مخنيوی: دا گرانه ده چې دا ناروغي دې له منځه يوړله شي، مگر ددې او د نورو ناروغو د مخنيوي بڼه لاره د کالوني ځواکمن ساتل دي او د يو مچۍ روزونکي لپاره مهمه ده چې لاندې ټکي په پام کې ونيسي: په مچۍ روزنه کې د حفظ الصحي رعايت کول، د مکروب ضد درملو کارول د ناروغۍ د مخنيوي لپاره، د افغان مچيو روزونکو ته سپارښتنه کېږي چې واره سيمه ايز گروپونه دې تشکيل کړي ترڅو وکولی شي د موم ې دوی پخپله توليد کړي. همدا د موم ورقې دي چې له خارجه واردېږي او د مچيو د روزنې لپاره د میکروبونو د خپرېدو وسيله گرځي. په عمومي ډول بايد د مچۍ روزنې وسايل دې په هيواد کې دننه جوړ شي.


درملنه: دا چې ددې ناروغۍ درملنه سل په سلو کې نه کېږي، ددې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره تر ټولو بڼه لاره په ناروغۍ د ککړو کالونيو سوځول دي چې د ناروغۍ د مخنيوي او دايمي درملنې لپاره مرسته کوي. هغه درمل چې ددې ناروغۍ د درملنې لپاره کارول کېږي، په لومړي سر کې دې په ازيټرومايسين درملنه وشي او که میکروب يې په وړاندې مقاومت وښود بيا دې د تایلوزين په انټي بيټيکو درملنه وشي.

د اروپايي لوک ناروغي: لوک ناروغي د مخ پر ودې بچيانو يوه ساري ناروغي ده چې تر ډيره له امريکايي لوک ناروغي سره ورته والی لري. دا ناروغي له امريکايي لوک څخه لږ خطر لري او ساري دی او په آسانی سره يې درملنه کېږي. د خرابو شويو لاروا گانو بوي يې له امريکايي لوک سره توپير لري.

دناروغي نېټې: د کالوني کمزوري کيدل او کله چې د کالوني سر خلاص شي، د تروشو شيدو بوی ورڅخه تر سپرمو کېږي، په دې ناروغۍ اخته لاروا گانې مخکې له دې چې د حجرې سر وتړل شي، مري او شونې دي چې مړه لاروا په حجره کې وليدله شي، که د گوگړو خلی په حجرې کې نښاسو، د امريکايي لوک په څير سرينناکه ماده نه لري او مري لارواگانې په حجره کې تورېږي او په آسانی سره را ايستل کېږي.



د اورپايی لوک نښي



د اورپايی لوک نښي

د ناروغی د لامل لیریدل: دا ناروغي د بچيانو په منځ کې د پرستار او باندني چاپيريال ته د کارگرو مچيو پواسطه ليريدول کيږي.

د ناروغی مخنيوی: ددې ناروغی مخنيوی هم په آسانی سره نه کيږي، ددې ناروغی د مخنيوي لپاره د اخته کالونيو له سوځولو او د وقايوي درملني لپاره يې له انټي بيوتيکو څخه کار اخيستل کيږي.

د ناروغی درملنه: ددې ناروغی درملنه او کنټرول د اوکسي تټرا سکلين پواسطه کيږي. مگر هغه شات چې له دوی څخه پاتې کيږي، په هغو کې د درملني د وخت تټراسکلين پاتې کيږي چې د انسانانو لپاره به خطرناکه وي. مگر ښه تگلاره داده چې لومړی په ناروغی اخته چوکاټونه راټول او وسوځول شي، پاتې چوکاټونه دې په تودو اوبو او صابون واينځل شي او بيا دې د انټي بيوتيکو پواسطه درملنه پيل شي.



د موم خورونکي چينجي لارواوی او د هغوي ضررونه

موم خورونکي چينجي: ددې ستونزې لامل د گالري ملونيل چينجی دی. دا باور شته چې ددې او د څو ډوله نورو چينجيو لاروا گاني د مچيو له موم څخه تغذيه کوي. معمولاً د ژمي په موسم کې د چوکاټونو د ذخيره شوي موم څخه تغذيه کوي همدارنګه په دې موسم کې چې گل نه وي، د کمزورو کالونيو د خالي چوکاټونو څخه چې په هغو کې مچي فعاليت نه لري، تغذيه کوي ځکه چې په دې وخت کې مچي په مرکزي چوکاټونو کې فعاليت کوي او ددې ستونزې د مخنيوي لپاره لاندې سپارښتنې په پام کې نيول شوي دي:

1. په ټول کال کې د کالونیو ځواکمن ساتل: ځواکمني کالونی کولی شي له موم خوړونکي چینجي سره مقابله وکړي او هغه د چوکاټ څنډو ته شري چې هلته لږ تاوان اړوي.
2. استعمال شوي چوکاټونه د ذخیره کولو په وخت کې باید په صندوق کې یو بل سره نږدې نه وي.
3. خالي چوکاټونه دې په یو سوړ ځای کې کښېښودل شي ځکه چې په سره هوا کې د لاروا تکثیر ډیر لږ وي. مګر په توده هوا کې یې فعالیت زیات وي.
4. د سوپر یا پاسني پور بیا کارول: هڅه دې وشي چې د لومړي کال له سوپر څخه په لومړي کال کې کار وانخلي او په دوهم کال کې یې وکاروي دا کار د موم خوړونکو چینجیو په مخنیوي کې مرسته کوي.
5. زاړه چوکاټونه لیرې کړئ او ژر یې ځای ډک کړئ.
6. چوکاټونه باید په پلاستيکي کڅوړو کې ونه ساتل شي.

د اړمنو خلکو موسسه د چک په جمهوریت کې یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې د نړۍ په گوټ، گوټ کې پراختیایي مرستې چمتو کوي.

دا مالوماتي پانې د کرنې د مسلکي لیسو د زده کړې په برخه کې د ښه والي راوستلو په موخه د چک جمهوریت د پراختیایي مرستو پواسطه خپرې شوي دي.

لیکوال: ډاکټر سردار ولی

ژباړونکی: اسدالله فکری

تصحیح: د کرنیزو ښوونو د ټیم لخوا

ډیزاین: عبیدالله صدري